

Efdal Azbin sc

BAĞ - BİBER (SERA) - DOMATES (TARLA) - HIYAR - KABAK - KARPUZ - ÇELTİK

Aktif Madde ve Miktarı **Azoxystrobin 250 g/L**
Grubu **C3:11**

FUNGUSİT (Mantar İlacı)
Koruyucu, tedavi edici

Efdal Azbin sc Kullan
Ürününüz
Güvende Kalsın



ETKİ ŞEKLİ

- “Azoxystrobin” aktif maddesi sporların çimlenmesini ve misel gelişimini önler.
- Antisporulant özelliğindedir.
- Çeşitli mantar hastalıklarında, fungal etmenlerin tüm yaşam döngülerinde etkilidir.
- Bitki dokularında translaminar özellik gösterir.

“Efdal AZBIN SC” Entegre Mücadelede kullanımı **GÜVENLİDİR**

ÖZELLİKLERİ

- **Azbin sc** geniş spektrumlu sistemik fungusittir.
- **Azbin sc** **Anılara bekleme süresi 1 gündür.**
- Tavsiye edilen dozlarda kullanılan **Azbin sc** bitkilere hiçbir olumsuz etkisi yoktur.
- **Azbin sc** Suyla hemen karıştığından her türlü ilaçlama aletiyle kullanılabilir.
- Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.
- Kullanmadan önce ilaç şişesini iyice çalkalayınız.
- pH'sı 7 civarında olan temiz su kullanılması tavsiye edilir.

Çeltik Yanıklığı (*Pyricularia oryzae*)Bağ Küllemesi (*Erysiphe necator*)Mildiyö (*Phytophthora infestans*)Külleme (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*)

KULLANMA ŞEKLİ ve ZAMANI

Bağ Küllemesi:

1. İlaçlama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,
2. İlaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,
3. İlaçlama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,
4. ve diğer uygulamalar:

Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Bağ Mildiyö: İlk uygulama sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. İlacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Bağ Ölükol: Yaz ilaçlaması,

1. İlaçlama: Sürgünler 2-3 cm olduğunda,
2. İlaçlama: Sürgünler 8-10 cm olduğunda,
3. İlaçlama: Sürgünler 25-30 cm olduğu devrede yapılmalıdır.

Biber (Sera)-Külleme: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalı ve gerektiğinde 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Çeltik Yanıklığı Hastalığı: Yeşil aksam ilaçlamalarında hastalık ilk görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Gerekli hallerde kullanılan ilacın etki süresi göz önüne alınarak ikinci ve üçüncü ilaçlamalar yapılmalıdır.

Domates (Tarla)- Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Domates (Tarla)- Mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Hiyar ve Kabak- Kabakgillerde Külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 °C'nin üstünde ve orantılı nemin %50 'nin altında olduğu zamanlarda ilaçlamaya ara verilmelidir.

Hiyar- Mildiyö: İlaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesiyle ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre ilaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Karpuz- Alternaria Yaprak Yanıklığı: Kimyasal ilaçlama yeşil aksam şeklinde uygulanır. Çevrede ilk belirtiler görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

KULLANILDIĞI BİTKİ ve HASTALIK ADI

BİTKİ ADI	HASTALIK ADI	KULLANIMA DOZU ve DÖNEMİ	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
BAĞ*	Bağ Küllemesi (<i>Erysiphe necator</i>)	75 ml/100 L su	21 gün
	Bağ Mildiyö (Plasmopara viticola)		
	Ölükol (Phomopsis viticola)		
BİBER (SERA)	Külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	75 ml/100 L su	3 Gün
ÇELTİK	Çeltik Yanıklığı (<i>Pyricularia oryzae</i>)	100 ml/da	28 Gün
DOMATES (TARLA)	Erken Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	75 ml/100 L su	3 Gün
	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)		
HIYAR	Kabakgillerde Külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	75 ml/100 L su	3 Gün
	Kabakgillerde Mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	60 ml/100 L su	
KABAK	Kabakgillerde Külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	75 ml/100 L su	3 Gün
KARPUZ	Alternaria Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria cucurbitina</i>)	75 ml/da	3 Gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Azbin sc'nin domatesteki uygulamalarında yayıcı ve yapıştırıcılarla karıştırılarak kullanılması önerilmez.