

Efdal Azibut

DOMATES (SERA)

Aktif Madde ve Miktarı	Azoxystrobin 200 g/L + Difeconazole 125 g/L
Grubu	C3:11; G1:3

FUNGUSİT (Mantar İlacı)
Geniş spektrumlu, Lokal sistemik etkili

**ÇİFT ETKİLİ,
SÜREKLİ
KORUMA**



Efdal Azibut

İLACI KULLANIRKEN

Kullanma dozu ve dönemine göre tavsiye edilen dozlara mutlaka uyunuz.

ETKİ ŞEKLİ

- “**Azoxystrobin**” aktif maddesi koruyucu, tedavi edici, sporları yok edici sistemik özelliktedir. Hastalık etmeninin solunum zincirini bozarak enerji üretimini engeller.
- “**Difeconazole**” aktif maddesi tedavi edici ve sporlanmayı engelleyici sistemik özellik gösterir. Hastalık etmeninin hücre çeperi oluşumunu engeller.
- Antisporulant etkisi etkisi ile hastalığı erken dönemde durdurur.
- Hastalık etmeninin yaşamı sürdürmesi için gerekli misellerin enerji üretimini engeller.

ÖZELLİKLERİ

- **Azibut** translaminar, antisporulant özellikleri ve çift etkili özelliği sayesinde külleme hastalıklarını kontrol eder.
- **Azibut** Bitki yapraklarından alınan ilaç dokulara hızlı nüfuz eder.
- **Azibut** Bitki kökleri tarafından alınan ilaç translaminar özelliği ile bitki dokularında taşınır.
- **Azibut** Uzun süre kalıcı etki gösterir.
- **Azibut** Yağışlarda yıkanmaya karşı dayanıklıdır.
- **SC** formülasyonludur.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız!
- Tavsiye edilen dozlarda kullanılan **Azibut** bitkilere hiçbir olumsuz etkisi yoktur.
- Kullanıldığı ürünlerde verim ve kalite artışı sağlar.
- Suyu hemen karıştırdıktan her türlü ilaçlama aletiyle kullanılabilir.
- Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.
- Kullanmadan önce ilaç şişesini iyice çalkalayınız.
- pH'sı 7 civarında olan temiz su kullanılması tavsiye edilir.



Külleme (*Leveillula taurica*)



Külleme (*Leveillula taurica*)

Azibut ihracat ürünlerinde kullanımı **GÜVENLİDİR.**
Entegre mücadele sisteminde kullanıma **UYGUNDUR.**

KULLANIM ŞEKLİ ve ZAMANI

Domates (Sera)- Patlıcangillerde Külleme: Uygulamalara çevrede ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Hastalık şiddetine göre 10-14 Gün ara ile uygulamalara devam edilir.

UYGULAMAYA HAZIRLAMA

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.

KULLANILDIĞI BİTKİ ve HASTALIK ADI

BİTKİ ADI	HASTALIK ADI	KULLANIMA DOZU VE DÖNEMİ	Son ilaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
DOMATES (SERA)	Patlıcangillerde Külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	100 ml /100 L su	3 Gün

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.

DOMATES FENOLOJİSİ



1



2

İlaçlama zamanı



3



4

İlaçlama zamanı



5

İlaçlama zamanı