

Aktif Madde ve Miktarı	Pirimiphos-methyl 500 g/l
Grubu	1B

İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
Kontak ve Mide zehiri, Fumigant etkili

**Üç Etkili
Üstün
KORUMA**



ETKİ ŞEKLİ

- Azphos**'nin aktif madesi Pirimiphos-methyl'dir.
- "Pirimiphos-methyl", Cholinesterase enzimini engeller.
- Azphos**'nin mide ve temas yoluyla etkisinin yanında kuvvetli bir fumigant etkisi de vardır.

ÖZELLİKLERİ

- Azphos**, Pamukta Beyazsineğe karşı, Domateste Yaprakbitlerine karşı kullanılmaktadır.
- Azphos** Boş ambarların dezenfeksiyonunda da kullanılır.

KULLANIM ARALIĞI

- Tarlada yapılacak olan ilaçlamalar zararlının durumuna göre 7-14 günde bir tekrarlanmalıdır.
- Sırt atomizörleri, sırt tulumları, traktöre monte edilebilen pülverizatörlerle tatbik edilebilir. Atomizörle yapılacak ilaçlamalarda aletin ilaç deposunun kapasitesi dikkate alınarak, normale göre 4 misli daha fazla ilaç konulmalıdır.

KULLANMA ŞEKLİ ve ZAMANI

Domates Yaprakbitleri, tarlaya köşegenler yönünden girilerek 3-5 adımda bir bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. Baklagillerde 25-50, patlıcan, kabakgiller ve lahana gibi büyük yapraklı bitkilerde 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda, bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise kimyasal mücadeleye başlamak gerekir. Bununla birlikte parazitoid ve predatörler gözlenerek, uygulamaya karar vermeden önce faydalıların etkinliği gözlenmelidir.

Pamukta Beyazsinek yoğunluğunun dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

Boş ambar uygulamasında, depolarda bütün yüzeyleri ıslatacak şekilde uygulama yapılır.



Beyazsineği (*Bemisia tabaci*)



Yaprakbitleri (*Aphis spp*)



Pirinçbiti (*Sitophilus oryzae*)



Baklagil Tohum böcekleri (*Bruchus spp.*)

KULLANILACAKI BİTKİ ve ZARARLILAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ADI	KULLANMA DOZU ve DÖNEMİ	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
BOŞ AMBAR UYGULAMASI	Arpa Güvesi (<i>Sitotraga cerealella</i>)	300 ml/100 m ²	—
	Baklagil Tohum böcekleri (<i>Bruchus spp.</i>)		—
	Buğdaybiti (<i>Sitophilus grananus</i>)		—
	Kırmabiti (<i>Tribolium confusum</i>)		—
	Kuru Meyve Güvesi (<i>Plodia interpunctella</i>)		—
	Patates Güvesi (<i>Phthorimaea operculella</i>)		—
	Pirinçbiti (<i>Sitophilus oryzae</i>)		—
DOMATES	Yaprakbitleri (<i>Aphis spp.</i>)	100 ml/100 L su Nimf, Ergin	4 Gün
PAMUK	Tütün Beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	200 ml/da Larva, Ergin	4 Gün

KARIŞILIRLIK DURUMU

Azphos diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce bir ön karışım yapılması tavsiye edilir.