

Efdal Barox 2 F

BAĞ, ZEYTİN, KAYISI, TURUNÇGİLLER, DOMATES

Aktif Madde ve Miktarı	Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Hidroksit 361,1 g/ L
Grubu	M:1

FUNGUSİT (Mantar İlacı)
Kontakt etkili

**Mikro Partiküllerle
Üstün Kaplama,
Yüksek
Koruyucu Etki**



Efdal Barox 2 F

İLACI KULLANIRKEN

Kullanma dozu ve dönemine göre tavsiye edilen dozlara mutlaka uyunuz.

ETKİ ŞEKLİ

- “Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Hidroksit” aktif maddesi mantar sporlarının çimlenmesini engeller.
- Su ile kolay karışır.
- Son teknoloji ile üretilmiş yüksek koruyucu etkili bakırlı fungusittir.
- Uzun süre etkilidir.

ÖZELLİKLERİ

- **Barox 2 F** fungal ve bakteri kaynaklı hastalık etmenlerine karşı koruyucudur.
- **Barox 2 F** SC formülasyonludur.
- Tavsiye edilen dozlarda kullanılan **Barox 2 F** bitkilere hiçbir olumsuz etkisi yoktur.
- **Barox 2 F** Suyla hemen karıştığından her türlü ilaçlama aletiyle kullanılabilir.
- Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.
- Kullanmadan önce ilaç şişesini iyice çalkalayınız.
- pH'sı 7 civarında olan temiz su kullanılması tavsiye edilir.

✓ **Barox 2 F** içerdiği bakır partiküllerinin çok küçük olması (0,3 mikron) olması nedeniyle sıvı bakır içeren diğer ilaçlarla karşılaştırıldığında yüzey kaplama özelliği emsallerden çok daha üstündür.

✓ **Barox 2 F** ilacı entegre mücadele sisteminde kullanıma uygundur.



Mildiyö (Plasmopara viticola)



Mildiyö (Phytophthora infestans)



Ölülük (Phomopsis viticola)



Kahverengi Leke (Alternaria alternata f. sp. citri)



Halkalı Leke (Spilocaea oleagina)

KULLANIM ŞEKLİ

Bağ- Mildiyö: 1. uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.

2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem çığ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Bağ- Ölülük:

***Kış Uygulaması:** Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.

***Yaz Uygulaması:** 1. Uygulama: Sürgünler 2-3 cm olduğunda,
2. Uygulama: Sürgünler 8-10 cm olduğunda,
3. Uygulama: Sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Kayısı- Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Çil):

1. Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
2. Uygulama: Ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe tomurcuğu döneminde)

Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. Uygulama yapılmalıdır.

Turunçgill- Kahverengi Leke: Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Domates- Mildiyö: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz küllü konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Zeytin- Halkalı Leke:Marmara Bölgesi: 1. Uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Ege Bölgesi:

1. Uygulama: Ilkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

Akdeniz Bölgesi:

2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
3. Uygulama: Ilkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

UYGULAMAYA HAZIRLAMA

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

Anlara bekleme süresi
1 gündür

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

BİTKİ ADI	HASTALIK ADI	KULLANIMA DOZU ve DÖNEMİ	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
*BAĞ	Mildiyö (Plasmopara viticola)	100 ml/100 L su	7 Gün
	Ölülük (Phomopsis viticola)		
KAYISI	Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus)	1. ilaçlama: 500 ml/100 L su (dormant dönem), 2. ve 3. ilaçlama: 250 ml/100 L su (Normal dönem)	7 Gün
TURUNÇGİLLER	Kahverengi Leke (Alternaria alternata f. sp. citri)	200 ml/100 L su	7 Gün
ZEYTİN	Halkalı Leke (Spilocaea oleagina)	250 ml/100 L su	14 Gün
DOMATES	Mildiyö (Phytophthora infestans)	200 ml/100 L su	7 Gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

KARIŞILIRLIK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile kullanılmadan önce bir deneme yapılarak daha sonra uygulamaya geçilmesi tavsiye edilir.