

Efdal Barox (WG)

BAĞ, ZEYTİN, NARENCİYE, DOMATES, ŞEFTALİ, KAYISI

Aktif Madde ve Miktarı	Bakır Hidroksit %77 (%50 Metalik Bakıra eşdeğer Bakır Hidroksit)
Grubu	M:1

FUNGUSİT (Mantar İlacı)
Kontakt Koruyucu Etkili

**Yüksek Bakır
Yüksek
Etki**



Efdal Barox (WG)

İLACI KULLANIRKEN

Kullanma dozu ve dönemine göre tavsiye edilen dozlara mutlaka uyunuz.

ETKİ ŞEKLİ

- “Bakır Hidroksit” Fungal ve bakteri kaynaklı hastalık etmenlerine karşı koruyucudur.
- Kontakt etkili olduğu için bitki içine ve meyve içine nüfuz etmez, bitki kökleri tarafından alınmaz.

İLACIN ÖZELLİKLERİ

- **Barox** (WG) Suda dağılılabilen granül (WG) formülasyonu sayesinde suda maximum düzeyde erir ve ilaç hazırlanırken kesinlikle tozuzmaz.
- **Barox** (WG) Lekesiz ve kaliteli ürün elde etmenizi sağlar.
- **Barox** (WG) Meyve ve sebzelerde kullanılan geniş spektrumlu bir fungusittir.
- **Barox** (WG) Koruyucu bir fungusit olması nedeniyle hastalık görülmeden önce uygulanmalı ve bitkinin her tarafı iyice ıslanacak şekilde kaplama ilaçlama yapılmalıdır.
- pH'sı 7 civarında olan temiz su kullanılması tavsiye edilir.
- **Çok küçük zerrelili, yüksek etkili fungusittir.**

KULLANIM ŞEKLİ ve ZAMANI

Bağ- Mildiyö: Sürgünler 25 cm uzunlukta olunca ilaçlamaya başlanır. 2. ve daha sonraki ilaçlamalar birinci ilaçlamanın etki süresi ve çevre koşulları da dikkate alınarak, enfeksiyon için uygun koşullar oluştuğunda yapılmalıdır.

Domates- Bakteriyel Benek Hastalığı, Erken Yaprak Yanıklığı: İlk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamalara başlanır. 10 gün ara ile 2-3 uygulama şeklinde ilaçlamalara devam edilir.

Kayısı- Yaprak Delen (Çil Hastalığı):

1. İlaçlama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
2. İlaçlama: Ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (Pembe çiçek tomurcuğu döneminde)

Narenciye- Alternaria Yaprak Yanıklığı: Ilkbaharda sürgünlerde ilk hastalık belirtisi görüldüğünde ilaçlamalara başlanır ve 10 gün ara ile devam edilir.

Şeftali- Yaprak Kıvrıklığı: İlaçlama tomurcuklar kabarmaya başladığı

dönemde yapılmalıdır.

Şeftali- Yaprak delen (Çil Hastalığı):

1. İlaçlama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra
2. İlaçlama: Ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce

Marmara Bölgesi:

1. İlaçlama: Tanelerin normal iriliğe eriştiği sonbaharda meyveler yeşil dane döneminde iken (Ekimin ilk yarısı)
2. İlaçlama: Ağaçların henüz çiçek açmadığı ilkbahar döneminde (Nisan),

Ege ve Akdeniz Bölgesi:

- 1.İlaçlama: Ağaçların sürgün vermeden önceki durgun dönemi (Ege: Şubat-Mart, Akdeniz: Kasım-Aralık)
- 2.İlaçlama: Ağaçların henüz çiçek açmadığı ilkbahar döneminde (Nisan)



Bağ Mildiyö
(*Plasmopara viticola*)



Domates Erken Yaprak Yanıklığı
(*Alternaria solani*)



Kayısı Yaprak Delen
(*Coryneum beijerinckii*)



Narenciye Alternaria Yanıklık Hastalığı
(*Alternaria citri*)



Şeftali Yaprak Kıvrıklığı
(*Taphirina deformans*)



Zeytin Halkalı Leke Hastalığı
(*Spilocaea oleagina*)

UYGULAMAYA HAZIRLAMA

Tavsiye dozu üzerinden bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır.

Uygulama makinesinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. İlaçlama, günün erken saatlerinde veya akşam serinliğinde bitkinin her tarafı iyice ıslanacak şekilde kaplama ilaçlama olarak ve rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.

Hazırlanan ilaç hemen kullanılmalıdır. Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla ilaçlı mahlül hazırlamayınız.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

BİTKİ ADI	HASTALIK ADI	KULLANIMA DOZU ve DÖNEMİ	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
*Bağ	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	250 g/100 L su	7 Gün
Domates	Erken Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	250 g/da	
	Bakteriyel benek hastalığı (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>)		
Kayısı	Yaprak Delen (<i>Coryneum beijerinckii</i>)	1.ilaçlama 500 g/ 100 L su (Dormant dönem) 2.ilaçlama 250 g/100 L su (Normal Dönem)	
Narenciye	Alternaria Yanıklık Hastalığı (<i>Alternaria citri</i>)	300 g/100 L su	
Şeftali	Yaprak Kıvrıklığı (<i>Taphirina deformans</i>)	350 g/100 L su	
	Yaprak Delen (<i>Coryneum beijerinckii</i>)		
Zeytin	Halkalı Leke Hastalığı (<i>Spilocaea oleagina</i>)	300 g/100 L su	

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Organik fosforlular ve düşük pH'lı ilaçlar dışında diğer akarisit ve insektisitlerle de karışabilir.