

İmal tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat tarihi ve no. su:
EFDAL CLORSUN® 10 WP Marmara Bölgesi hububat ekim alanlarında kullanılmalıdır. Diğer bölgelerde kullanılması tavsiye edilmemektedir.

KONTROL EDİLEN YABANCI OTLAR:

Çıkış öncesi tatbikatlarla kontrol edilenler	
Kokar ot	(<i>Bifora radians</i>)
Bülbül otu	(<i>Sisymbrium altissimum</i>)
Yavşan otu	(<i>Veronica spp.</i>)
Kanarya otu	(<i>Senecio vulgaris</i>)

Çıkış sonrası tatbikatlarla daha iyi kontrol edilenler

Köygöçüren	(<i>Cirsium arvense</i>)
Yapışkan Otu	(<i>Galium tricomutum</i>)
Yabani hardal	(<i>Sinapis arvensis</i>)
Kokar ot	(<i>Bifora radians</i>)
Tarla Yavşan otu	(<i>Veronica arvensis</i>)
Kır teresi	(<i>Lapidium draba</i>)

Çıkış öncesi veya sonrası tatbikatlarla kontrol edilenler

Kokar ot	(<i>Bifora radians</i>)
Yabani hardal	(<i>Sinapis arvensis</i>)
Papatya	(<i>Matricaria chamamilla</i>)
Tarla Yavşan otu	(<i>Veronica arvensis</i>)
Sarmaşık çoban değneği	(<i>Polygonum convolvulus</i>)
Turna gagası	(<i>Geranium tuberosum</i>)
Süpürge otu	(<i>Sisymbrium altissimum</i>)

UYGULAMA ZAMANI:

ÇIKIŞ ÖNCESİ: Buğday Doz: 7,5 g/da

Dar yapraklı yabancı otlar çıkış öncesi tatbikatlarla daha iyi kontrol edilir. Tatbikat üniform olarak buğday ekiminden sonra 3-4 gün içinde yapılmalıdır. Genel olarak ilkbaharda çıkış yapan geniş yapraklı yabancı otları kontrol etmek için ikinci bir tatbikata gerek yoktur.

ÇIKIŞ SONRASI: Buğday, arpa, yulaf, çavdar, triticale Doz: 7,5 g/da
Tatbikat hububatın 2-3 yapraklı devresinden kın devresine kadar olan dönem içinde herhangi bir zamanda yapılabilir.

KULLANILMASI: EFDAL CLORSUN® 10 WP, hububat-nadas-hububat veya hububat-hububat ekim nöbetlerinin uygulandığı alanlarda tavsiye edilir.

FİTOTOKSİTE: Münavebe bitkilerinde özellikle Brassica türleri ve çeker pancarında fitotoksik olabilir. Tavsiye edildiği bitkilere, tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında fitotoksik değildir.

İLACIN HAZIRLANMASI: Gerekli miktardaki ilaç az bir suyla önce bulamaç haline getirilir. Yarsına kadar su dolu ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırıcı çalıştırılır ve tank gerekli miktarda su ile tamamlanır. Fazla bekletmeden uygun zamanda ilaçlamaya geçilir.

KARIŞILIRLIK: 2,4-D amin, 2,4-D ester, Dichlofop-methyl, Fenoxaprop-P-ethyl ihtiva eden ilaçlarla karışabilir.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL CLORSUN® 10 WP

HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

Suda ıslanabilir toz (WP)

Etkili Madde Miktarı: %10 Chlorsulfuron

1-(2-chlorophenylsulfonyl)-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl) urea

LD₅₀ : 5545 mg/kg

DİKKAT

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ.
- İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
- İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, SİĞARA İÇMEYİNİZ.
- DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
- İLAÇLANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

UYARI İFADELERİ: Gözlerde geçici iritasyon yapabilir. Göz ile temasında bol su ile yıkanmalıdır. Herhangi bir klinik zehirlenme olayına rastlanmamıştır.

ANTİDOTU:

Antidotu yoktur.

NOT: Üründe bir zarar ortaya çıkabileceğinden EFDAL CLORSUN® 10 WP i anormal hava şartları ve kuraklık deneyiyle baskıya ve zararlılar tarafından hasara uğratılmış bitkilere tatbik etmeyiniz.

EFDAL CLORSUN® 10 WP hububatta (buğday, arpa, yulaf, çavdar) yabancı ot mücadelesinde kullanılan etki alanı geniş bir yabancı ot ilacıdır. Suda ıslanabilir toz formülasyonda hazırlanmıştır. Düşük dozlarda kullanılır, seçiciliği çok yüksektir. EFDAL CLORSUN® 10 WP kökler ve yeşil aksam yoluyla yabancı otlar tarafından bünyelerine alınır. Hassas yabancı otların büyümesi uygulamadan kısa bir süre sonra durur. Ancak ölüm belirtileri büyüme şartlarına, yabancı otların hassasiyetlerine bağlı olarak uygulamadan 1-2 hafta sonra görülür. Uygulamadan sonra 2 saatlik yağışsız süre yabancı ot kontrolünün en yüksek seviyede olması açısından önemlidir. Uygulamadan sonraki sıcak ve nemli şartlar ilacın etkisini hızlandırır, soğuk ve kurak şartlar geciktirir. Uçucu ve yanıcı değildir. İlaçlama aletlerini aşındırmaz. EFDAL CLORSUN® 10 WP i stres altındaki bitkiye kullanmayınız. Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında ilaç, tek yıllık pek çok geniş yapraklı ve bazı dar yapraklı yabancı otu kontrol eder. Birçok iki yıllık ve bazı çok yıllık yabancı otlar da kontrol edilir veya baskı altında tutulur.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114 Sadece Zehirlenme durumlarında arayınız.



Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri İştirakidir.

Net Miktar :
Brüt Ağırlığı :
Azami per. Satış fiyatı :

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anlara zehirlidir.
 - Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
 - Gıda ve hayvan yemine bulaştırmayınız.
 - Boş ambalajları başka bir amaçla kullanmayınız.
- Usulüne uygun imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU: İlaç imal tarihinden itibaren, normal (serin ve kuru) şartlar altında, ağız sıkıca kapalı olarak orijinal ambalajında, 2 yıl süre fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini korur.

ÖNEMLİ UYARI: TAVSİYE DIŞI KULLANILMAMALIDIR. İLAÇLAMA YAPARKEN İLACIN SULAMA KANALLARINA KARIŞMAMASINA VEYA DİĞER KÜLTÜR BİTKİLERİNE BULAŞMAMASINA DİKKAT EDİLMELİDİR. İLAÇLAMA SONRASI İLAÇLAMA ALETLERİNİN ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI GEREKLİDİR.

FİRMA BEYANI: Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firma ilaçlarının kalitesini garanti eder, fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, uygulama hataları, tavsiyeye uymadaki eksiklikler ve depolamadaki hatalardan dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Turgutlu yolu 9.km
MANİSA
Tel: 0 236 2340909 pbx.
Faks: 0 236 2379645
www.tarkimbk.com.tr

TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sedef YÖREKTEKİ
Yüksek İhtiyaç

03 Ağustos 2010

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KURUMA ve KONTROL GÜCEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR