




Elma • Bağ • Patlıcan • Fasulye • Hıyar • Şeftali • Pamuk • Soya

Aktif Madde ve Miktarı **Clofentezine 500 g/l**
Grubu **10A**

AKARİSİT (Kırmızı Örümcek İlacı)
Kontak etkili

Kırmızı Örümcek
Güvenli sorununun
Çözümü




ETKİ ŞEKLİ

“Clofentezine” Temas yolu ile etkili olup uzun kalıcı aktiviteye sahiptir.

ÖZELLİKLERİ

- EFDAL DİCO 500 SC “Clofentezine” aktif maddesini içeren SC formülasyonlu bir akaristittir.
- EFDAL DİCO 500 SC kırmızıörümceklerin embriyo ve yumurta gelişimini engeller.
- EFDAL DİCO 500 SC en büyük etkisi yumurta dönemindedir.
- İlaçlamadan en iyi sonucu alınabilmesi iyi bir kaplama ilaçlama ile mümkündür.



Kırmızıörümceklerin Hayat Döngüsü

Entegre mücadele programları için uygundur.

KULLANMA ARALIĞI

- EFDAL DİCO 500sc'yi yılda yalnız bir kere kullanınız.

KULLANIM ZAMANI

Bağ İki Noktalı Kırmızıörümcek; Mücadelede popülasyon yoğunluğu yaprak başına ortalama 5-8 adet hareketli bireyi geçtiğinde,

Elma- Kırmızıörümcekler ve akarlar; Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Fasulye Kırmızıörümcek; Fasulyede yaprak başına ortalama 3-5 adet canlı Kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Hıyar Kırmızıörümcek; Hıyarda yaprak başına ortalama 5 adet canlı birey görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Pamuk İki Noktalı Kırmızıörümcek; Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlar ilaçlanmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesinde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 10 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Patlıcan Kırmızıörümcek; Patlıcanda yaprak başına ortalama 5 adet canlı birey görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Soya Pamuk Kırmızıörümceği; Baklalar olgunlaştıktan sonra uygulama yapılmamalıdır. Bir yaprakçıkta ortalama Akdeniz Bölgesinde 5 adet, Ege Bölgesinde 10 adet Kırmızıörümcek bulunduğu kaplama ilaçlama yapılmalıdır.

Şeftali İki Noktalı Kırmızıörümcek; Yapılan sayımlarda, yaprak başına ortalama 3 adet üzerinde Kırmızıörümcek bulunması durumunda uygulama yapılmalıdır.



Avrupa Kırmızıörümceği (*Panonychus ulmi*)



Kırmızıörümcekler (*Tetranychus spp.*)



İki Noktalı Kırmızıörümcek (*Tetranychus urticae*)



İki Noktalı Kırmızıörümcek (*Tetranychus urticae*)

Hazırlanan ilaç hemen kullanılmalıdır. Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla ilaçlı mahlül hazırlamayınız.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ADI	KULLANMA DOZU	Son ilaçlama ile hasat arası süre
BAĞ*	İki Noktalı Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/ 100 L su	56 Gün
	Akdiken Akan (<i>Tetranychus viennensis</i>)		
ELMA	Avrupa Kırmızıörümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	20 ml/ 100 L su	28 Gün
	İki Noktalı Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)		
FASULYE	Kırmızıörümcekler (<i>Tetranychus spp.</i>)	30 ml/ 100 L su	3 Gün
HIYAR	Kırmızıörümcekler (<i>Tetranychus spp.</i>)	30 ml/ 100 L su	3 Gün
PAMUK	İki Noktalı Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	40 ml/ 100 L su	—
PATLICAN	Kırmızıörümcekler (<i>Tetranychus spp.</i>)	30 ml/ 100 L su	3 Gün
SOYA	Pamuk Kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	40 ml/ 100 L su	—
ŞEFTALİ	İki Noktalı Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	30 ml/ 100 L su	21 Gün
Soya	Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	40 ml/ 100 L su	-

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapılmadan mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır.