

Efdal • 48 SC Diflumin

Elma, Armut, Pamuk

Aktif Madde ve Miktarı	Diflubenzuron 480 g/ L
Grubu	15

İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
Kontakt ve mide etkili insektisit

**Uzun Süreli
Etkili ve Çevreye
Güvenli**



ETKİ ŞEKLİ

- “Diflubenzuron” Sistemik olmayan kontakt ve mide etkili böcek büyüme düzenleyicisidir.
- “Diflubenzuron” Kitin sentezi inhibitörüdür.
- “Diflubenzuron” Böceklerin deri değiştirmesini ve yumurtalarının açılmasını engeller.

ÖZELLİKLERİ

- **Diflumin** Süspansiyon konsantre (SC) formülasyonludur.
- **Diflumin** Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız!
- **Diflumin** Kullanıldığı ürünlerde emniyetlidir.
- **Diflumin** Suyla hemen karıştığından her türlü ilaçlama aletiyle kullanılabilir.
- Kullanmadan önce ilaç şişesini iyice çalkalayınız.
- pH'sı 7 civarında olan temiz su kullanılması tavsiye edilir.

Diflumin ilacı Entegre mücadele sisteminde kullanımı **“GÜVENLİDİR”**.

KULLANIM ARALIĞI

- **Diflumin** larvalara geniş kullanım aralığına sahiptir.
- Zararlı popülasyon yoğunluğu dikkate alınarak uygulamalar ilk uygulamadan 3-4 hafta sonra tekrarlanabilir.



Armurt Psillidi
(*Cacopsylla pyri*)



Elma içkurdu
(*Cydia pomonella*)



Elma Ağkurdu
(*Yponomeuta malinellus*)



Armurt Yaprak Galerigüvesi
(*Leucoptera scitella*)



Pamuk Yaprakkurdu
(*Spodoptera littoralis*)

KULLANIM ZAMANI

Armurt Psillidine Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15'den fazlasında bulaşma görüldüğünde ilaçlama yapılır.

Elma içkurdu: Elma içkurduna karşı yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef her dölle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

! Elma içkurduna karşı mücadele yapılan bahçelerde yaprak galeri güvelerine karşı mücadele yapmaya gerek yoktur.

Elma Ağkurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.

Elmada Armurt Yaprak Galerigüvesi: Her ağaçtan 20 adet olmak üzere en az 5 ağaçtan belirlenen yerlerden yaprak alınıp canlı larva sayılmalıdır. Yaprak başına 4 veya daha fazla larva varsa uygulama yapılmalıdır.

Pamukta Pamuk Yaprakkurduna: 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0,5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Hazırlanan ilaç hemen kullanılmalıdır. Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla ilaçlı mahlül hazırlamayınız.

KULLANILDIĞI BİTKİ ve ZARARLILAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ADI	KULLANMA DOZU ve DÖNEMİ	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
ARMUT	Armurt Psillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	25 ml + 50ml yayıcı yapıştırıcı /100 L su	14 Gün
	Armurt Yaprak Galerigüvesi (<i>Leucoptera scitella</i>)	20 ml/100 L su	
ELMA	Elma Ağkurdu (<i>Yponomeuta malinellus</i>)	20 ml/100 L su	
	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	20 ml/100 L su	
PAMUK	Pamuk Yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	30 ml/da	

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Karışım durumu bilinmediğinden ön karışım denemesinin yapılması önerilir.