

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat tarihi ve no. su: 05.02.2010 / 7534

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:

Bitki Adı	Yabancı ot Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Hububat	Kanavcı otu (<i>Adonis spp.</i>) Kandamlası (<i>Adonis flammula</i>) Karamuk (<i>Agrostemma githago</i>) Farekulağı (<i>Anagallis arvensis</i>) Sigirdili (<i>Anchusa leptopylla</i>) Papatya (<i>Anthemis spp.</i>) Tarla köpek papatyası (<i>Anthemis arvensis</i>) Taşkesen otu (<i>Buglossoides arvensis</i>) Sürünücü çan çiçeği (<i>Campanula rapunculoides</i>) Küçük pıtrak (<i>Caucalis platycarpus</i>) Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Güneş dikenini (<i>Centaurea solstitialis</i>) Pelemir (<i>Cephalaria syriaca</i>) Farekulaklı boynuz otu (<i>Cerastium perfoliatum</i>) Sarı mum çiçeği (<i>Cerinth minor</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Ak hindiba (<i>Chondrilla juncea</i>) Yabancı hindiba (<i>Cichorium intybus</i>) Hazeran (<i>Consolida anthoroides</i>) Yabancı karanfil (<i>Dianthus anatholicus</i>) Avrupa dönbabası (<i>Eradium hoeffftianum</i>) Sütlağacı (<i>Euphorbia microspora</i>) Tarla atkuyruğu (<i>Equisetum arvense</i>) Anadolu şahteresi (<i>Fumaria kralikil</i>) Hakiki şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Adi şahtere (<i>Fumaria vaillantii</i>) Turnagagası (<i>Geranium spp.</i>) Yabancı çivit otu (<i>Isatis tinctoria</i>) Dikenli yabancı marul (<i>Lactuca serriola</i>) Mürdümük (<i>Lathyrus spp.</i>) Yabancı tere (<i>Cardaria draba</i>) Ballıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>) Yabancı mürdümük (<i>Lathyrus aphaca</i>) Yabancı ebegümeci (<i>Malva sylvestris</i>) Taş yoncası (<i>Melilotus indica</i>) Sarı taş yoncası (<i>Melilotus officinalis</i>) Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>) Çobançeğni (<i>Polygonum aviculare</i>) Tarla düğün çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>) Yabancı turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Muhabbet çiçeği (<i>Reseda lutea</i>) Kanarya otu (<i>Senecio vernalis</i>) Yabancı hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Bülbül otu (<i>Sisymbrium officinale</i>) Kuş otu (<i>Stellaria media</i>) Yemlik (<i>Tragopogon bupththalmoides</i>) Pıtrak (<i>Turgenia latifolia</i>) Arap baklası (<i>Vaccaria pyramidota</i>) Yavşan otu (<i>Veronica persica</i>) Yabancı fiğ (<i>Vicia spp.</i>)	Kardeşlenme dönemi başlangıcında 160 ml/ da Kardeşlenme dönemi sonunda 200 ml/ da preparat dozda kullanılır. Karadeniz bölgesinde geç dönemde 300 ml/ da dozda kullanılır. (Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.)
Mısır	Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Bozot (<i>Heliotropium europaeum</i>) Yabancı Turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Yabancı Hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Eşek Marulu (<i>Sonchus arvensis</i>)	200 ml / da Çıkış sonrası uygulanır

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A. Ş.



tarkim

EFDAL DİMETRİN

Suda Çözünen Konsantre (SL)

GRUBU	O	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	---	-----------------------------

500 g/l 2,4-D asite eşdeğer dimethyl amin tuzu

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının % üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: İlaç ağız yoluyla alındığında kusma, ishal, reflekslerde azalma, vücut faaliyetlerinde düzensizlik görülür. Nabız hızlı atar, bazı olaylarda ölüm görülebilir. Hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde karaciğer ve böbreklerde hasar görülmüştür. Temas ettiği deride arazlar görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma: Temiz havaya çıkartınız. Gerekli ise suni solunum yapınız. Doktora başvurunuz.

Yutma: Herhangi bir sıvı vermeyiniz. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Tıbbi bakım alınız.

Cilt teması: Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız.

Göz teması: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dâhil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Bir uzmana başvurunuz.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 144

13 Haziran 2024

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR EDİLMİŞTİR.



Net Miktarı:

Azami per. Satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

2,4-diklorofenoksiasetik asit ve Dimethyl amin

ZARARLILIK İŞARETİ:**UYARI KELİMESİ: DİKKAT****ZARARLILIK İFADELERİ:**

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ:

P264: Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın.

P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu /yüz koruyucu kullanın.

P501: İçeriği/kapı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılar için zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Kuşlara zehirlidir.
- Bitki koruma ürünü tahıl dışında kültür bitkilerine zararlı olduğundan bitki koruma ürünü veya buharının civar bitkilere etki yapmaması için çok dikkatli olunmalıdır.
- Rüzgâr hızı 16km/saat' ten fazla olduğunda ilaçlamaya ara verilmelidir.
- Uygulama yapılan günlerde hava sıcaklığı 8°-25°C arası olmalıdır.
- Uygulamadan 6 saat içinde yağmur yağması halinde ilaçlama tekrarlanmalıdır.
- Dondan veya uzun süreli kuraklıktan sonra, çiğ olduğu veya yağış beklenen kapalı havalarda bulutlu günlerde ilaçlama yapmayınız.
- Uygulamadan sonra ilaçlama aleti iyice temizlenmelidir.
- Şeker hastalarını ilaçlama içinde çalıştırmayınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını başka gayelerle kullanmayınız

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

EFDAL DİMETRİN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu O olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **EFDAL DİMETRİN**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda se farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

CARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırarak kullanmayınız.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A. Ş.

tarkim
EFDAL DİMETRİN

Suda Çözünen Konsantre (SL)

GRUBU	O	HERBİSİT (Yabancı Ot ilacı)
-------	---	--------------------------------

500 g/l 2,4-D asite eşdeğer dimethyl amin tuzu

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında depolandığında 4 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:


TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A. Ş.
 Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:287 MANİSA
 Tel: 0 236 2340909
 Faks: 0 236 2379645
 www.tarkimbk.com.tr

Sedef YÜCEL TEKOĞLU
 Yüksek Kurul Yöneticisi
 TARKİM BİTKİ KORUMA
 SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

13 Haziran 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
 GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 KABUL EDİLMİŞTİR.

39


Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
 Daire Başkanı