

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Şarj No:

Ruhsat tarihi ve no. su: 16.02.1988 / 2132

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Armut	Karaleke (<i>Venturia pirina</i>)	150 g/100 L su	14 gün
Elma	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	150 g/100 L su	14 gün
Erik	Cep hastalığı (<i>Taphrina pruni</i>)	300 g/100 L su	14 gün
Şeftali	Monilya (<i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i>)	300 g/100 L su	14 gün
Kiraz, Vişne	Monilya (<i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i>)	300 g/100 L su	14 gün
Şeftali, Kavısı	Yaprak delen (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>)	300 g/100 L su	14 gün
Turunçgiller	Turunçgil Meyvelerinde Kahverengi Çürüklük ve Gövde Zamlanması (<i>Phytophthora citrophthora</i>)	300 g/100 L su (Meyve enfeksiyonları)	28 gün
Yeni Dünya	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i> var. <i>eriobotryae</i>)	300 g/100 L su	14 gün
Bağ **	Olukol (<i>Phomopsis viticola</i>)*	250g/100 L su (Yaz Uygulaması)	28 gün
Sebze	Mildiyo (<i>Plasmopara viticola</i>)	300 g/100 L su	28 gün
Fideler***	Kök Çürüklüğü (Çökerten) (<i>Phythium spp.</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Alternaria spp.</i> , <i>Sclerotinia spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)	200-250 g/100 L su	28 gün
Domates	Mildiyo (<i>Phytophthora infestans</i>)	100 L su Dekara*** 300 g/100 L su 120 g/da	14 gün
Marul	Yaprak küfü (<i>Cladosporium fulvum</i>)	250 g/100 L su	14 gün
Soğan	Mildiyo (<i>Bremia lactucae</i>)	300 g/100 L su	28 gün
Patates	Mildiyo (<i>Peronospora destructor</i>)	300 g/100 L su	28 gün
Karanfil	Mildiyo (<i>Phytophthora infestans</i>)	350 g/100 L su	28 gün
Domates	Pas (<i>Uromyces canophyllus</i>)	250 g/100 L su	14 gün
Tütün (Fidelik)	Sebzelerde Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	250 g/100 L su	14 gün
	Çökerten (<i>Phythium spp.</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Alternaria spp.</i> , <i>Sclerotinia spp.</i>)	200 g/100 L su	28 gün

*Yaz uygulamasında kullanılır.

**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

***Fidelik ilaçlamalarında verilen iki doz hastalığın yoğunluğuna ve bitki vejetasyon süresine göre değişmektedir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaç su deposu ilave edilir. Karıştırma devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

28 Ocak 2022

YARIN VE ORMAN BAKANLIĞI
T.C. ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL CAPTANIM 50 WP

GRUBU	M: 4	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
İslanabilir Toz (WP)		

%50 Captan

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSIYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Deri, göz, burun ve boğazda tahriş yapılabilir.

ILKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma Halinde: Solunduğu takdirde temiz havaya çıkartınız. Soluma, yutma ya da temas halinde tıbbi yardım alınız ve mümkünse yanınızda ilacın etiketini ya da güvenlik bilgi formunu bulundurunuz.

Yutma Halinde: Herhangi bir sıvı vermeminiz. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermemeyiniz. Tıbbi bakım alınız.

Cilt Teması Halinde: Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız. Etkilenen vücut bölgesinde yanık varsa giysileri çıkarmayın ve mümkün olduğunca cildi soğuk tutmaya çalışınız.

Göz Teması Halinde: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dâhil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Bir uzmana başvurunuz.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Toksitesisi düşük olup, özel bir antidotu yoktur.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarkim Kredi-Kooperatifleri şirkettir.



Net miktarı:

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

Captan

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H331: Solunması halinde toksiktir.

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P260: Tozunu/ dumanını/ gazını/ sisini/ buharını/ spreyini solumayın.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde: Tıbbi yardım/bakım alın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun

**TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

İzmir Oğat Mh. Turgutlu Cad. No:287 Şişlihanlar MAH.SİSİ
Tel: 0 236 234 9999 Pbx. Fax: 0 236 237 96 15
Rica V.D. 52 * 031 1007
Yerleşim Yeri: 0827 / 03014 08700112 eva.tarkim.com.tr



Bağ Öükol:

Yaz uygulaması:

1. uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda,
2. uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda,
3. uygulama sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Bağ Mildiyö:

İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1. ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Sebzelerde Kök Çürüklüğü (Çökerten):

Fidelikte hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez bir hafta ara ile uygulama yapılır.

Domates Mildiyö:

Mücadeleyle çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kü gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Domates Yaprak Kufü: Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. İlaçlamalar 10-15 gün ara ile tekrarlanır. Hasada 15-20 gün kala ilaçlama kesilmelidir.

Marul Mildiyö: Fideliklerde hastalık görülmeden koruyucu bir ilaçlama yapılmalıdır. Mildiyö görürse hasta kısımlar toplanıp yok edildikten sonra birer hafta aralarla fidelerin tarlaya şaşırtılmasına kadar ilaçlamalar sürdürülmelidir. Tarla devresinde hastalığın çevrede görülmesi ile ilaçlamaya başlanmalı, birer hafta aralarla devam edilmelidir. Fidelikte ilaçlama sulama yapıldıktan ve yapraklar kuruduktan sonra yapılmalıdır.

Soğan Mildiyö:

Günlük ortalama sıcaklığın 16°C'ye ulaşması ve orantılı nemin %80'i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile uygulamalara başlanabilir.

Patates Mildiyö:

Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

Karanfil Pasi: Çelikler sıraya geçirilmeden önce uygulamaya başlanmalı ve 10' ar gün ara ile uygulamalar yapılmalıdır.

Sebzelerde Kurşuni Kuf: Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır.

Tütün Çökerten (Fidelerde): Fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde uygulamaya başlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

EFDAL CAPTANIM 50 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M:4 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **EFDAL CAPTANIM 50 WP**'nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M: 4 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Alkali karakterli ve yağlı ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Diğer ilaçlarla karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

28 Ocak 2022

BAĞIM VE ORMAN BAKANLIĞI
TDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

28 Ocak 2022

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Tic: 1.Ş.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FIRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:287 MANİSA
Tel: 0 236 2340909 pbx.
Çağrı Merkezi:4443150
Faks: 0 236 2379645
www.tarkimbk.com.tr

EFDAL CAPTANIM 50 WP

İslanabilir Toz (WP)

GRUBU M: 4 FUNGİSİT (Mantar ilacı)

%50 Captan

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.

TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Turgut Özal Mah. Turgutlu Caddesi No:287 Söğütözü MANİSA
Tic. Sic. No: 2340909
Bilgi V.D. 524004 1065
Mersis No: 0823 0340 000100012 www.tarkimbk.com.tr

