

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Seri No:
Tarih ve no. su: 01.04.2021 / 11881

ACAĞI BITKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Armut psilidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	40 g / 100 L su (Nimf, ergin)	7 gün
Armut içkürdü (<i>Cydia pomonella</i>)	40 g / 100 L su (Larva)	7 gün
Elma içkürdü (<i>Cydia pomonella</i>)	40 g / 100 L su (Larva)	7 gün
Şeftali / Nektarin Çiçek thrips'i (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	30 g / 100 L su (Larva, ergin)	7 gün
Salkım güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	20 g / 100 L su (Larva, Yumurtla)	7 gün
Bağ* (<i>Rubiothrips vitis</i> , <i>Mycetothrips albicornis</i> , <i>Mycetothrips tschirkunae</i> , <i>Thrips tabaci</i>)	30 g / 100 L su (Larva, ergin)	7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta, bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesini deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakten karışım depoya ilave edilir. Karıştırıma devam edilerek depo suyla tamamlanır. Karışımın hazırlanması sırasında pH'sı 7 civarında olan temiz su kullanılması tavsiye edilir. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılır.

KALIBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamamın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesini deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

05 Mart 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KÖRÜTME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAYIT EDİLMİŞTİR.

Devamı Arka Sayfada

Tarım Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret



EPDAL CYCNET 250 WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

GRUBU	5	INSEKTSİT (böcek ilacı)
%25 Spinetoram		

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün buhar ve/veya zerrecelerini solumayınız.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulamış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edilen şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

ILK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluması halinde: Kazadevi açık havaya çıkartınız. Solumun durmuşsa suni solumun yapınız. Doktora danışınız.

Yutulması halinde: Bilgisiz bir kişiye asla ağzdan herhangi bir şey vermeyiniz. Ağzı suyla çalkalayınız. Doktora danışınız.

Cilt ile Teması Halinde: Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Eğer etrafınızda polietilen giysi varsa ilk onunla daha sonra ise bol su ile yıkamalısınız. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız. Etkilenen vücut bölgesinde yank varsa giysileri çıkarmayın ve mümkün olduğunca cildi soğuk tutmaya çalışınız. Tıbbi bakım alın.

Göz ile Teması Halinde: En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile tamamen yıkayınız ve bir doktora danışınız.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarım Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



Net Miktarı:

Azami per. Satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Spinetoram

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H361f: Üremeye zarar verme şüphesi var.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu kullanın.

P308 + P313: Maruz kalıma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardıma/bakım alın.

P501: İçerdiği/Kabı 'Atık Yönetimi Yönetmeliği' uyarınca bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılarla zehirlidir. Arıların aktif olarak polen topladığı dönemde uygulama yapmayınız.
- Balıklar, suda yaşayan diğer canlılara çok zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına, sulama ve içme suyu kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Hazırlanan bitki koruma ürünü hemen kullanılmaktadır. Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla karışım hazırlamayınız.
- Hazırlanan bitki koruma ürününün direk güneş ışığından korunması gerekir.
- **EPDAL CYCNET 250 WG** bir fermantasyon ürünüdür.
- Mide ve temas yolu ile hedef zararlıların sınırlanmasına etki eder ve hedef organizmanın beslenmesini hemen durdurur. Buna bağlı olarak en geç 3 gün içinde ölüm gerçekleşir.
- Armut psilidinin nimf ve ergin döneminde mükemmel kontrol sağlar.
- Kültür bitkilerine karşı son derece emniyetlidir ve bugüne kadar yürütülmüş denemelerin hiçbirinde fitotoksikite belirtilene rastlanmamıştır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KÖRÜTME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TARIM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

EPDAL CYCNET 250 WG' den, en iyi sonucu almak için tavsiye dozunda kullanılması şarttır. Suyla arıştırıldan her türlü uygulama alet ve ekipmanı ile uygulanabilir. **EPDAL CYCNET 250 WG** zemas etkili bir bitki koruma ürünü olduğundan uygulama sırasında bitkinin tüm yüzeyinin isına özen gösterilmesi gereklidir; hedef dışı organizmalara zarar vermemek ve ısrafı önlemek için, zerreceklerin kültür bittişinin dal ve yapraklarında birleşerek damla oluşurup akmayacak şekilde uygulama yapılmalıdır.

Armut psilidine karşı kışlayan döl erginlelerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı, sürgünlerin %15'ten fazlasında bulasma görülmeye başladığı, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

Elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdı müddesinde hedef, her dölde ait larva çıkışı süresince ağaçları ilacli bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Armutta tahmin ve erken uyarı sistemi dikkate alınmaz.

Bağ salıkm güvesine karşı salıkm güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşır, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıklar üst üste 2 gün 15°C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her dölde bir uygulama yapılır.

Bağ tripslerine karşı bağda ilkbaharda gözler uyanmaya başlayıp, ilk yapraklar görüldüğünde zararlıların popülasyon yoğunluğu en az 2-3 thrips ergin veya larva/yapraklık olarak saptandığında uygulama yapılmalıdır. Asmanın yeşil aksamının tümüne uygulama yapılmasına özen gösterilmelidir. Bir uygulama yeterlidir.

Şeftali/ nektarinde çiçek tripsine karşı 100 sürgünün en az %10'u zararlı ile bulasaksa çiçeklerin %5'i açıldığında uygulama yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: **EPDAL CYCNET 250 WG** isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu 5 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **EPDAL CYCNET 250 WG**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 5 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösterin.

KARİŞİLBİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



tarkim

EPDAL CYCNET 250 WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

GRUBU	5	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
%25 Spinetoram		

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Aktif kömürle mide yıkamı, kan dolaşımına yardım amacıyla plazma ve Novadrol tatbik edilir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI: Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:**TARKİM BITKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:287 MANİSA

Tel: 0 236 234 09 09 (pbx.)

Çağrı Merkezi: 4443150

Faks: 0 236 2379645

www.tarkimbk.com.tr

Sedef YÜCEL TEKÖĞÜLU

Yüksek Kimyager

TARKİM BITKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

09 Mart 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.