

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat tarihi ve no. su:

KULLANILACĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Kavun	Kabakgillerde külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	15 g/100 L su	3 gün
Bağ *	Bağ küllemesi (<i>Erysiphe necator</i>)	10 g/100 L su	35 gün
Elma	Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	15 g/100 L su	14 gün
	Alternarya meyve çürüklüğü (<i>Alternaria alternata</i> = <i>Alternaria tenuis</i>)	20 g/100 L su	14 gün
Turuncgiller	Kahverengi leke (<i>Alternaria alternata</i> f. sp. citri)	20 g/100 L su	28 gün
Çeltik	Çeltik yanıklığı (<i>Pyricularia oryzae</i>)	20 g/da	35 gün
Karpuz	Alternarya yaprak yanıklığı (<i>Alternaria cucumerina</i>)	20 g/da	3 gün
Kayısı	Yaprak delen (çil) (<i>Wilsonomyces carpophylus</i> = <i>Stigminta carpophila</i>)	12,5 g/100 L su	14 gün
Domates (Sera)	Patlıcangillerde külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	15 g/100 L su	3 gün
Biber (Sera)	Patlıcangillerde külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	15 g/100 L su	3 gün
Şerbetçiotu	Şerbetçiotu küllemesi (<i>Podosphaera macularis</i>)	15 g/100 L su	21 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLAMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

10 Kasım 2022
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL FİN 50 WG

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

GRUBU	C3:11	Fungisit (Mantı ilacı)
-------	-------	------------------------

%50 Trifloxystrobin

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 2 saat insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, iavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANIMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürünü ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Solunması halinde: Kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız.

Yutulması halinde: Herhangi bir sıvı vermeyiniz. Tbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Bilinçsiz bir işiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Tbbi bakım alınız.

Cilt ile teması halinde: Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız.

Göz ile teması halinde: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dâhil olmak üzere en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Tbbi bakım alınız.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TE: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri İştirakidir.



Net Miktarı
Azami per. Satış fiyatı

İÇİNDEKİLER: Trifloxystrobin

UYARI İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
EUH208: Trifloksistrobin içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tbbi yardım/müdahale alın.
P501: İçeriği/kabı 'Atık Yönetimi Yönetmeliği' uyarınca bertaraf ediniz.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı uygulamayınız.
- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
- Bitki koruma ürünü kendi ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ticaret Sicil No: 287/2010
Tic. Sic. No: 12122
Tic. Sic. No: 12122
Tic. Sic. No: 12122

Bariş SÜREL
Ziraat Yüksek Mühendisi

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Kabakgillerde küleme (Kavun): İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 °C'nin üstünde ve orantılı nemin de %50'nin altında olduğu durumlarda uygulamaya ara verilir.

Bağ küleme: 1. uygulama çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde, 2. uygulama çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının olduğu dönemde, 3. uygulama çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde, 4. ve diğer uygulamalar üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Elma karalekesi: 1. uygulama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce), 2. uygulama pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde), 3. uygulama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce, 4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Elmada alternarya meyve çürüklüğü: Birinci uygulama meyve tatlanma başlangıcında (yaklaşık ¼ meyve büyüklüğünde) yapılır. İkinci uygulama ilk uygulamada kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi bitiminde yapılmalıdır.

Turunçgilde kahverengi leke: Uygulamalara sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıklarının arttığı ve meyvenin 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Çeltik yanıklığı: Yeşil aksam uygulamalarında hastalık belirtileri bölgede görülür görülmez veya hava koşulları hastalık gelişmesine uygun şekilde gidiyorsa, hemen uygulamaya başlatılmalıdır. Gerekirse ürünün etki süresine ve hava koşullarına bağlı olarak ikinci veya üçüncü uygulama yapılmalıdır.

Karpuzda alternarya yaprak yanıklığı: Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etki süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı): 1. uygulama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2. uygulama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde), 3. uygulama meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

Domates (sera) ve Biber (sera) patlıcangillerde küleme: Uygulamalar serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır.

Şerbetçiotu küllemesi:

1. uygulama: Hastalık koşulları oluştuğunda veya hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde,
2. ve diğer uygulamalar: Kullanılan ürünün etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları sona erince kadar uygulamalara devam edilir.

Uygulama programında son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL FİN 50 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu C3:11 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL FİN 50 WG'yi aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3:11 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Karışım yapılacaksa, karıştırılmadan önce ön karışım denemesi yapılmalıdır.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.

**EFDAL FİN 50 WG****Suda Dağılıbilen Granül (WG)**

GRUBU	C3:11	Fungisit (Mantarilacı)
-------	-------	------------------------

%50 Trifloxystrobin**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:**

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydıyla, imalatçı ürünlerinin kalitesini garanti eder. İmalatçı ürünün uygun olmayan koşullarda depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiye dışı kullanımdan doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:**TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**

Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No: 287 MANİSA

Tel: 0 236 234 09 09 pbx.

Faks: 0 236 237 96 45

Çağrı Merkezi: 444 31 50

www.tarkimbk.com.tr**TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**

Turgut Özal Mahallesi Turgutlu C. No:287 Şehzadeler-MANİSA
 Tel: 0 236 234 09 09 Pbx Fax: 0 236 237 96 45
 BTKB T.C. D. 821030 1067 Tic. Sic. No: 42122
 Tesis No: 0824 0301 0670 0012 www.tarkimbk.com.tr

Barış SÜREL

Ziraat Yüksek Mühendisi

**10 Kasım 2022**

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.