

İmal tarihi:
Son kullanma tarihi:
Şarj numarası
Ruhsat tarihi ve numarası: 31.03.2016 / 10583

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ve Hasat Arası Süre
Karanfil (Süs bitkisi)	Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	60ml/da	1 gün
Domates (Tarla-sera)	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>) Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	60ml/da (Larva, nimf, ergin)	1 gün
Hıyar (Sera)	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>) Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	60ml/da (Larva, nimf, ergin)	1 gün
Kornişon (Sera)	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>) Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	60ml/da (Larva, nimf, ergin)	1 gün
Biber (Sera)	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>) Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	60 ml/100 L su (Yumurta, larva, nimf, ergin)	1 gün
Patlıcan (sera)	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>) Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	60 ml/100 L su (Yumurta, larva, nimf, ergin)	1 gün
Çilek	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	60 ml/100 L su (Larva, nimf, ergin)	1 gün
Çilek	Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	60 ml/100 L su (Larva, nimf, ergin)	1 gün
Bağ*	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	60 ml / 100 L su (Yumurta, larva, nimf, ergin)	14 gün
Pamuk	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	60 ml / da (Yumurta, nimf, ergin)	42 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL FLOWMİTE 240 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	25	AKARİSİT (Kırmızıörümcek ilacı)
-------	----	---------------------------------

240 g/l Bifenazate

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan ve gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız
- Bitki koruma ürününün uygulanması esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara içmeyiniz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya ürün bitki üzerinde kurumadan insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Deri ve gözde tahriş yapabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Solunması halinde: Solunması halinde, kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız.
Yutulması halinde: Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Ağzı suyla çalkalayınız. Doktora danışınız.
Cilt ile teması halinde: Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız.
Göz ile teması halinde: En az 15 dakika boyunca bol miktarda su tamamen yıkayınız ve bir doktora danışınız.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:
Bifenazate

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

ÖNLEM İFADELERİ:

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanınız.
P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf ediniz.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSULAR:

- Balıklara zehirlidir. Yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- İlaçlamadan 6 saat sonra yağın yağmur ilacın etkisini azaltmaz.
- Ürünü ambalajlarında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Bitki koruma ürünü serin, kuru ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
- Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
- Boş ürünün ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.

Sedef YÜCEL TEKOĞLU
Yüksek Kinyaper
TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

24-05-2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

EFDAL FLOWMİTE 240 SC, kırmızı örümceklerin kontrolünde kullanılan seçici bir akarısittir.

EFDAL FLOWMİTE 240 SC, karanfil, domates, hıyar, çilek, biber, patlıcan ve bağda kırmızı örümceklerin tüm hareketli dönemlerine karşı etki ederek ani etkili ve uzun süreli kalıcı bir etki sağlar.

ETKİ ŞEKLİ: Kırmızı örümceklerin sinir sistemini bozarak hiperaktiviteye (sürekli hızlı hareketlilik) neden olur. İlaç ile temas eden kırmızı örümceklerin beslenmesi 3 saat içerisinde durur. Ölüm 3-4'üncü günde görülmeye başlanır. **EFDAL FLOWMİTE 240 SC** yaprak üzerinde uzun süreli kalıcı etkiye sahip kontakt etkili bir akarısittir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Karanfil (süs bitkisi) – Pamuk kırmızı örümceğine karşı: İlaç bitkilere çiçeklenmeden önce veya çiçek kesiminden sonra uygulanmalıdır. Bir yaprakta ortalama 10 adet kırmızı örümcek bulunduğundan uygulama yapılır. Tek uygulama yeterlidir.

Domates (tarla-sera), Patlıcan (sera), Hıyar (sera), Kornişon (sera), Biber (sera)- Kırmızıörümcekler: Domates, Patlıcan, Hıyar ve Kornişonda yaprak başına ortalama 5 adet, biberde 3 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır

Çilek- iki noktali kırmızıörümcek:

Erken dönem uygulaması: Kırmızıörümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında, çiçek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görülmeden önce) kırmızıörümcekler görüldüğünde bir uygulama yapılmalıdır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha güvenlidir.

Mevsim içi uygulaması: Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, açıkta yetiştirilen çilekler meyve başında (Mart sonu- Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve ilaçlanması yeterlidir. Popülasyonun yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinden en az 50 yaprakçık incelenir. Yaprakçık başına 15 ve üzerinde kırmızıörümcek tespit edilmesi halinde uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.

Bağ- iki noktali kırmızıörümcek: Mücadele popülasyon yoğunluğu yaprak başına ortalama 5-8 adet hareketli bireyi geçtiğinde yapılmalıdır.

Pamuk- iki noktali kırmızıörümcek: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlara BKÜ uygulaması yapılmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesi'nde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 10 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Popülasyonun yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yaprak incelenir. Yaprak başına 15 ve üzerinde kırmızı örümcek tespit edilmesi halinde uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL FLOWMİTE 240 SC isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu 25 olarak sınıflandırılmış bir akarısittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL FLOWMİTE 240 SC 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 25 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösterin.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile ön karışım testi yapılmadan kullanılmamalıdır.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL FLOWMİTE 240 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	25	AKARİSİT (Kırmızıörümcek ilacı)
-------	----	---------------------------------

240 g/l Bifenazate

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması ve hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:287 MANİSA

Tel: 0 236 2340909 pbx. Faks: 0 236 2379645

www.tarkimbk.com.tr

Sedef YÜCEL TEKOĞLU
Yüksek Kimyager
TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

24-05-2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

