

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Sarı Numarası:

Ruhsat Tarihi ve Numarası: 12.06.2015 / 10285

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



tarkim

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu (100 litre su)	Son Uygulama ile Hesap Arasındaki Süre
Armut	Karaleke (Venturia pirina)	2000 g götüş + 2000 g sönmüş kireç* (Dal sıracası var ise) 1000 g götüş + 1000 g sönmüş kireç* (Dal sıracası var ise)	21 gün
	Memeli pas (Gymnosporangium fuscum)	1000 g götüş + 1000 g sönmüş kireç*	21 gün
Elma	Karaleke (Venturia inaequalis)	2000 g götüş + 2000 g sönmüş kireç* (Dal sıracası var ise) 1000 g götüş + 1000 g sönmüş kireç* (Dal sıracası var ise)	21 gün
	Sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kanser ve zamlanma (Pseudomonas syringae pv. syringae)	3000 g götüş + 3000 g sönmüş kireç* (1. uygulama) 1000 g götüş + 1000 g sönmüş kireç* (2. uygulama)	21 gün
Kayısı	Sert çekirdekli meyvelerde yaprak dökme (Çil) (Wilsonomyces carpophylus = Stigmella carpophylus)	2000 g götüş + 2000 g sönmüş kireç* (1. uygulama) 1000 g götüş + 1000 g sönmüş kireç* (2. uygulama)	21 gün
	Çep hastalığı (Taphrina pruni)	2000 g götüş + 2000 g sönmüş kireç*	21 gün
Erik	Sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kanser ve zamlanma (Pseudomonas syringae pv. syringae)	1000 g götüş + 1000 g sönmüş kireç* (1. uygulama) 600 g götüş + 600 g sönmüş kireç* (2. uygulama)	21 gün
Kırsa	Yaprak kıvrık kılığı (Taphrina deformans)	2000 g götüş + 2000 g sönmüş kireç*	21 gün
Şeftali	Sert çekirdekli meyvelerde yaprak dökme (Çil) (Wilsonomyces carpophylus = Stigmella carpophylus)	3000 g götüş + 3000 g sönmüş kireç* (1. uygulama) 1000 g götüş + 1000 g sönmüş kireç* (2. uygulama)	21 gün
Yeni Dünya	Karaleke (Venturia inaequalis var. enabatrype)	1500 g götüş + 1500 g sönmüş kireç*	21 gün
Anteef olığı	Karazenk (Pseudocercospora platanoj)	1500 g götüş + 1500 g sönmüş kireç*	21 gün
Badem	Dal kanseri (Pseudomonas amygdali)	3000 g götüş + 3000 g sönmüş kireç* (1. uygulama) 1000 g götüş + 1000 g sönmüş kireç* (2. uygulama)	21 gün
Fındık	Bakteriyel yanıklık (Xanthomonas arbuticola pv. coryli)	1000 g götüş + 1000 g sönmüş kireç* (90, 3 oranında kara boya yapıştırdı) olarak ilave edilmiştir.	21 gün

19 Ocak 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLİŞTİR

Dr. N. Duran

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarkim Kredi Kooperatifleri İştirakidir.

Barış S. Duran

Zehir Uzmanı Mühendisi

TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı T.C. 2015
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı T.C. 2015
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı T.C. 2015
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı T.C. 2015

EFDAL GÖZTAŞIM

Kristal Toz Formülasyon

GRUP	M:1	Fungisit (Mantar ilacı)
------	-----	----------------------------

%25 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Sülfat

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün buhar ve / veya zerrecilerini solumayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Uzun süre devamlı temas halinde temas ettiği yerde tahnislere sebep olabilir. Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

ILKYARDIM ÖNLEMLERİ

Soluması Halinde: Solunuma takdire temiz havaya çıkartınız. Soluma yutma ya da temas halinde tıbbi yardım alınır ve mümkünse yutmuşlu ilacı etkilem ya da güvenle bilgi formunu bulundurunuz.

Yutulması Halinde: Kusturmayınız. Bilinçsiz bir kişiye ağız ağızdan herhangi bir şey vermemeyiniz. Ağzı suyla çalkalayınız. Doktora danışınız.

Çift ile temas halinde: Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız.

Göz ile temas halinde: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarını altı dşil olmak en az 15 dakika boyunca ırsce yıkayınız. Bir uzmana başvurunuz.

Net miktar:

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER

Bakır Sülfat

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ: (H)

H302 Yutulması halinde zararlıdır

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H410 Sulul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etkil.

ÖNLEM İFADELERİ: (P)

P273 Çevreye verilmesinden kaçınım

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P391 Dokuntuları toplayın.

P501 İçeriyi/kabı "Atık Yönetimi Yönetmeliği" uyarınca bertaraf edin

EU401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

- Aclara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanılmayınız.
- Baklılara zehirlidir. sulara bulaşmamız.
- Sıkı konuma ürününe orijinal ambalajında, kısıpaltı olarak tutunuz.
- Boş bittiği koruma ürünü kaplarını beşya maksatlar için kullanmayınız ve tavsiyete uygun olarak imal ediniz.

EFDAL GÖZTAŞIM

Kristal Toz Formülasyon

GRUP	M:1	Fungisit (Mantar ilacı)
------	-----	----------------------------

%25 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Sülfat

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ: Özel Antidotu yoktur. Aktif karbon verilerek mide yıkama kan dolaşımına yardım amacıyla Plasma ve Navadrol uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



Tarım Bankası Kuruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
Tarım Kredi Kooperatifleriştir.

Lahana	Mildiyö (<i>Brassica oleracea</i>)	1000 g götəşi + 1000 g sönmüş kireç*	21 gün
Turuncgil	Turuncgil meyvələrində kahverəngi çürükük və gövdə zəiflənməsi (<i>Physophthora citrophthora</i>)	2000 g götəşi + 2000 g sönmüş kireç* 1000 g götəşi + 1000 g sönmüş kireç*	21 gün
	Göy Yankığı (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>)	1000 g götəşi + 1000 g sönmüş kireç* 1500 g götəşi + 1500 g sönmüş kireç* 2000 g götəşi + 1000 g sönmüş kireç*	23 gün
	Zeytinlərdə təkəllə ləkə (<i>Aspicularia nigra</i>) + <i>Cyrtosporium oleaginum</i>)	1500 g götəşi + 1500 g sönmüş kireç* (1. uygulama) 1000 g götəşi + 1000 g sönmüş kireç* (2. uygulama)	23 gün
Zeytin	Dal Kanser (<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>savastanoi</i>)	1000 g götəşi + 1000 g sönmüş kireç* (ilk bahar başlanması) 1000 g götəşi + 2000 g sönmüş kireç* (diğer illərlər)	21 gün
	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	500 g götəşi + 500 g sönmüş kireç* (1. uygulama) 1000 g götəşi + 1000 g sönmüş kireç* (2. uygulama) 1500 g götəşi + 1500 g sönmüş kireç* (3. uygulama)	21 gün
	Ölükl (<i>Phomopsis viticola</i>)	4000 g götəşi + 4000 g sönmüş kireç* (1. uygulama)	21 gün
Əgər**		3000 g götəşi + 3000 g sönmüş kireç* (1. uygulama) 500 g götəşi + 500 g sönmüş kireç* (2. uygulama - yaz mü.) 1000 g götəşi + 1000 g sönmüş kireç* (2. uygulama - yaz mü.) 1500 g götəşi + 1500 g sönmüş kireç* (3. uygulama - yaz mü.)	25 gün
Veriştirgic	Serkopora erkən yaprak ləkəsi (<i>Cercospora arachidicola</i>)	1000 g götəşi + 1000 g sönmüş kireç*	21 gün
Meyvə- əgərləri	Rəslənin kök çürüklüyü (<i>Rosellinia necatrix</i>)	2000 g götəşi + 100 l su m ² 'yə 10 L su gələcək şəkildə ağacların dipinə ne uygulanır.	21 gün
	Kök Kanser (<i>Agrobacterium tumefaciens</i>)	5000 g götəşi + 5000 g sönmüş kireç*	21 gün
Tatlıca	Fəhlərdə çəkertən (<i>Phytophthora solani</i>) <i>Fusarium spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> <i>Alternaria spp.</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	500 g götəşi + 500 g sönmüş kireç* (*tohumlar ekilip həftə gətirisi ilə oraldan sonra)	21 gün

*) Sönmemiş kireç kullanılacak olması durumunda kireç miktarları yarı (1/2) oranında kullanılır.

**) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Takvîye dosu üzerinden hesaplanan bütüî koruma tutunu önce aynı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulanma zamanı anınesamı deposu yağıya kadar su ile dolur. Makineye sarğıncısı çalgı düğümünden karğıncı su deposu ilave edilir. Karğıncıya devam edilecek derd suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karğıncıya devamlı devam edilir. Hazırlanan bütüî koruma tınıcı aynı gün içinde kullanılır.

19 Nisan 2022

**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
A ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR**



TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SANATYVE TIGER
 100% Organic Turmeric
 100% Natural
 100% Pure
 100% Safe
 100% Effective

BARIŞ SÜREL

Ziraat Yüksek Mühendisi

Bordo bulamacı:

Göz taşı, kireç ve suyun birbiriyle karıştırılması suretiyle elde edilir. Eğer %1 lik bordo bulamacı kullanılırsa, önce 50 litrelik tozla bir varilde 1 kg göz taşı eritilir, 200 litrelik başlıkla bir tahta varilde 1 kg göz taşı eritilir, 2 sormuş kireç varilde ve su ilavesiyle karıştırılır. Daha önce hazır olan göz taşı eriyiği kireçli su üzerine yavaş yavaş dökülür ve devamlı olarak karıştırılır. Hiçbir zaman kireçli su göz taşı eriyiği üzerine dökülemez. Bulamacı kaliteli olup olmadığını anlamak için bulamaca tarımsal kâğıdı veya test kağıdına, kâğıt batırılır. Kırmızı turnusol mav, beyaz fenolftaleinli kâğıt ise siyah olursa bulamacı iyi demektir. Aksi orsa bir miktar dana kireçli su ilave edilir.

KALIBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlanacak şekilde belirli alanlara verilecek karıym miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

ILAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkamışsınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmıyoruz. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmıyoruz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANIMA ŞEKLİ:

Armut karalekesi:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabadığında (dış sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. Uygulama: Çiçek gözleri rozet dönmeye
3. Uygulama: Çiçek rozet dönmeye
4. ve diğer uygulamalar iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.

Armut memeli pası:

1. Uygulama: Çiçek tomurcukları patlamadan hemen önce,
2. Uygulama: Çiçek tomurcukları rozet dönmeye,
3. Uygulama: Çiçek rozet dönmeye, ilkbaharın yağışlı geçtiği iklim koşullarında, ürünün etki süresi dikkate alınarak yağışlar bitinceye kadar diğer uygulamalara devam edilir.

Elma karalekesi:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabadığında (dış sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. Uygulama: Pembeye çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler aynı ayı görüldüğünde)
3. Uygulama: Çiçek rozet dönmeye
4. ve diğer uygulamalar iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

Sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kanser ve zamlanma (Kayısı, Kiraz):

1. Uygulama: Sonbaharda yaprakların %75'i döküldüğünde
2. Uygulama: İlkbaharda gözler uyanmadan önce yapılır.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak deleni:

1. Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
2. Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde), Kayınlarda ilave olarak, meyvelerde, çanak yaprak ve çiçek organ kablası meyvenin ucuna ayrılarak uygulanmalıdır.

Enklerde Çop Hastalığı:

1. Uygulama: Tomurcuklar kabadığı dönemde,
2. Uygulama: Çiçek rozet dönmeye
3. Uygulama: Çiçek rozet dönmeye
4. ve diğer uygulamalar iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.

19 Nisan 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Y GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL GÖZTAŞIM

Kristal Toz Formülasyon

GRUP	M:1	Fungisit (Mantar ilacı)
------	-----	----------------------------

%25 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Sülfat

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri işbirliğindedir.

TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Teşkilatın Adresi: Ç. Anadoluhisari Yolu
101200, 34390, İstanbul, Türkiye
Tic. Sic. No: 27227
Vergi No: 3439000000000000

BENİŞ SÖREL
Ziraat Yüksek Mühendisi

1. Uygulama: Sonbaharda çiçek tohumcuklarını kabarmadan önce,
2. Uygulama: Çiçek tohumcuklarını almadan önce,
3. Uygulama: Çiçek taç yapıklarının dokümanından sonra,
4. ve diğer uygulamalar: çiçek uygulamaları hasada 20 gün kalın
ürününün etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Uygulama
göre değerlendirilebilir. Uygulama sayısı ve tarihleri kaydedilir.

1. Uygulama koruyucu fonksiyonlarla mücadele yapılacaktır. Uygulamaların mutlaka ilk enfeksiyonlardan önce, yaprakların açılmaya başladığı dönemde; tedavi edici fonksiyonlarla mücadele yapılacaktır. Ayrıca tedavi edici fonksiyonlarla ilk belirtilerin görüldüğü dönemde batar uygulama yapılabilir.

2. ve diğer uygulamaları: Kullanılan bitki koruma ürününün özelliği, etki süreleri ve yağış durumu dikkate alınarak 15 gün aralıklarla yapılır.

1. Uygulama: Sonbaharda yapraklar %75 oranında dokulunca,

2. Uygulama: İlbaharda çiçek tomurcuklarının patladığı ve kırmızı uçların görüldüğü pembe dönemde yapılır.

1. Uygulama: Hasattan sonra sonbahar yağışları başlamadan önce ağustos sonu veya eylül başında,
2. Uygulama: Sonbahar sonlarında, yağrakların %75'inin düküldüğü bir devrede,

3. Uygulama: İlibaharda yaprak tomurcukları patlamaya başladığı bir devrede, yapılır.

Lahana mıdıyoşu: Fideciklerde, fideciklerin toprak yüzüne çıkmasıyla, tarlada ise ilk mıdıyoş ekelerinin çevrede görülmesi ile uygulamalara başlanır.

- Meyve enfeksiyonlarına karşı:

1. Uygulama: Sonbaharda yağışlar başlamadan önce yapılmalıdır.

Turuncgöğü dal yamığı: Uygulamaya, hasattan sonra çok kuru dallar temizlendikten sonra başlanılır. Hatif bulayık bahçelerde ilk uygulama hasat sonrası olmak üzere 1 ay ara ile 2 kez %1,5' luk bordo ilkbahar aylan yağışı ve ilk seyredivorsa hasattan sonra başlamak üzere birer ay ara ile 2-3 kez %1,5' luk bordo bulamacı ve eşek tomurculukları patlamadan önce %1' ile doruğa bir uygulamaya daha başlanmalıdır. Bu sekildeki bahçelerde en az 3 yıl kimyasal uygulamalara devam edilmelidir.

Marmara Bölgesinde:

1. Uygulama: Sorbarda süzünler görülmeden hemen önce.
2. Uygulama: Çiçek somaxları belliginleştikten sonra çiçekler açmadan önce.

2. Uygulama: İlk bahar şurunteleri görülmeden hemen önce,

3. Uygulama: Çiçek somakları belaginin üstteki sonra, çiçekler açmadan önce, Akdeniz Bölgesinde:

1. Uygulama: Hazırlan sonarı
 2. Uygulama: İlkbahar surgunleri görulmeden hemen önce,
 3. Uygulama: Çiçek somakları belirlenliştikten sonra, çiçeller açmadan önce yapılmalıdır.
- Tüm uygulamaların yağyaların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

Tüm uygulamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gerekmektedir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



EFDAL GÖZTAŞIM

Kristal Toz Formülasyon

GRUP	M:1	Fungisit (Mantar ilacı)
------	-----	----------------------------

%25 Metalik Bakıra eşdeğer Bakır Sülfat

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



Farklı Bitki Koruma Serisi ve Ticaret A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri ağıdır.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firma dışına korumalı olarak taşınmalıdır. Ambalajlar, taşıma sırasında kırılmaları önlemek için uygun şekilde paketlenmelidir. Ambalajlar, taşıma sırasında kırılmaları önlemek için uygun şekilde paketlenmelidir. Ambalajlar, taşıma sırasında kırılmaları önlemek için uygun şekilde paketlenmelidir.

TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

[illegible]

Bary SORÉ
Ziraat Wüksek Mühendisi

Zeytin Dal Kanseri: Ege ve Akdeniz Bölgelerinde kanserle bulaşık zeytinlikler iki yıl içinde budama yapmaksızın yılda 4 defa ilaçlama yapılır. İlkbahar uygulamasında %1'lik diğer uygulamalarda %2'lik bordo bulamacı kullanılır. İkinci yılın sonunda temmuz-ağustos aylarında budama yapılır. Karadeniz Bölgesinde ise, 2. uygulama (şubat) yapılmaz, ancak dolu ve don zararlı olursa şubat uygulaması yapılır. Diğer üç devredeki uygulamalar aynı dönemlerde yapılır.

1. Uygulama: Aralık sonunda hasattan hemen sonra.
2. Uygulama: Şubat sonunda dolu, don zararından sonra.
3. Uygulama: İlkbahar yağmurları başlamadan önce.
4. Uygulama: Sonbahar yağmurları başlamadan önce, yapılır.

Bağ Mildiyö: 1. Uygulama: Sürün boyu 25-30 cm uzunluğa olunca uygulanmalıdır.
2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem çığ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Bağ Ölüklü:
- Kış Uygulaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.

- Yaz Uygulaması:
1. Uygulama: Sürünler 2-3 cm olduğunda.
 2. Uygulama: Sürünler 8-10 cm olduğunda.
 3. Uygulama: Sürünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Bağ Antraknozu:
Kış uygulaması: Bağlar budandıktan sonra, gözlerin henüz uyanmadığı devrede uygulanmalıdır.

Yaz Uygulaması: Bağ mildiyösi ile fenolojeye göre uygulama yapılmalıdır. Bağı antraknozu için ayrıca yaz uygulamasına gerek duyulmaz. Aynı uygulamaya gerektiği takdirde aşağıdaki program uygulanır.

1. Uygulama Sürünler 5-10 cm.
2. ve diğer uygulamalar: 1. uygulamada kullanılan fungisitün etki süresi dikkate alınarak yapılır. Taneler yarı büyüklüğünü aldığı döneme kadar uygulama devam edilir. Çiçeklenme döneminde uygulama tavsiye edilmez.

Yerfistğinde serkospora erken yaprak lekesi: Uygulamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta sonra başlanır. Hasada kadar devam edilebilir.

Meyve ağaçlarında rosellinia kök çürüklüğü: Sonbaharda veya ilkbahar başında ağaçların iz düşümlerine %2'lik göz taşı ile m²'ye 10 litre ilaşı su gelecek şekilde uygulama yapılmalıdır.

Meyve ağaçlarında kök kanseri: Meyve ağaçlarında kök kanserine karşı mücadele temmuz ve ağustos aylarında yapılır. Birer hafta ara ile iki operasyonla tümörler dezenfekte edilmiş, bıçakla iyice temizlenerek yara yerine %5 oranında göz taşı eriviği ve kuruduktan sonra da nebatı katran fırça ile sürülür. Ağaçların kök ve kök boğazı tekrar toprakla kapatılır.

Tütün fidelerinde çökerten: Tonumlar ekilip kapak gübresiyle ortulduktan sonra veya fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılır. Hastalık görülmez yapılacak ilaçlamalar, şaşırma devresine kadar haftada bir yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
EFDAL GÖZTAŞIM adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup M:1 olarak sınıflandırılmış bir fungistir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlama uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **EFDAL GÖZTAŞIM**'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M:1 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİLEBİLİRLİK DURUMU:
Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanımı tavsiye edilmez.

19 Nisan 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Tic. A.Ş.



EFDAL GÖZTAŞIM

Kristal Toz Formülasyon

GRUP	M:1	Fungisit (Mantar ilacı)
%25 Metalik Bakıra eşdeğer Bakır Sülfat		

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım İredi Kooperatifleri İştirakidir.



ÜRETİCİ FIRMA:
AVEN KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Adres: İnönü Mahallesi, 20. Sokak No: 13
Muradiye / MANİSA
Tel: 0236 214 04 86 - Fax: 0236 214 04 87
RUHSAT SAHİBİ FIRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Turgut Özal Mahallesi, Turgutlu Caddesi No:287
MANİSA
Tel: 0 236 2340909 pbx.
Faks: 0 236 2379645
www.tarkimbk.com.tr

TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Turgut Özal Mahallesi, Turgutlu Caddesi No:287
MANİSA
Tel: 0 236 2340909 pbx.
Faks: 0 236 2379645
www.tarkimbk.com.tr

Barış SÜREL
Ziraat Yüksek Mühendisi

