

mal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj No:  
Ruhsat Tarihi ve Numarası:

#### KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

| Bitki Adı     | Zararlı Organizma Adı                                                            | Uygulama Dozu  | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| Elma          | Elma karalekesi<br>( <i>Venturia inaequalis</i> )                                | 30 g/ 100 L su | 7 gün                                  |
| Elma          | Elma küllemesi<br>( <i>Podosphaera leucotricha</i> )                             | 40 g/ 100 L su | 14 gün                                 |
| Armut         | Armut karalekesi<br>( <i>Venturia pirina</i> )                                   | 30 g/ 100 L su | 7 gün                                  |
| Ayva          | Ayva Monilyası<br>( <i>Sclerotinia linhartiana</i> )                             | 50 g/ 100 L su | 14 gün                                 |
| Kayısı        | Çiçek Monilyası<br>( <i>Sclerotinia laxa</i> )                                   | 40 g/ 100 L su | 14 gün                                 |
| Nohut         | Nohut antraknozu<br>( <i>Ascochyta rabiei</i> )                                  | 50 g/ da       | 10 gün                                 |
| Antepfıstığı  | Karazenk<br>( <i>Pseudocercospora pistocina</i> )                                | 50 g/ 100 L su | --                                     |
| Nar           | Kahverengi leke hastalığı<br>( <i>Alternaria alternata</i> )                     | 50 g/ 100 L su | --                                     |
| Mandarin      | Kahverengi leke hastalığı<br>( <i>Alternaria alternata</i> f. <i>Sp. Citri</i> ) | 40 g/ 100 L su | 7 gün                                  |
| Şeftali       | Çiçek Monilyası<br>( <i>Sclerotinia laxa</i> )                                   | 40 g/ 100 L su | 14 gün                                 |
| Vişne / Kiraz | Çiçek Monilyası<br>( <i>Sclerotinia laxa</i> )                                   | 40 g/ 100 L su | 7 gün                                  |
| Vişne / Kiraz | Meyve monilyası<br>( <i>Monilinia fructigena</i> )                               | 40 g/ 100 L su | 7 gün                                  |

Koruyucu ve önleyici etkiye sahip, translamınar ve lokal- sistemik olarak taşınan bir fungusittir. Spor çimlenmesini, çimlenme tüpü ve misel gelişimini, spor oluşumunu önler. Boscalid ile Pyraclostrobin' in etkileri birleştirilerek, yüksek kontrol sağlayan ve iki farklı etki şekline sahip etkin madde içermesiyle direnç yönetimine ve IPM'e uygun bir ilaç olarak geliştirilmiştir. İyi bir kalıcı etkisi vardır.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:** Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



## EFDAL JOVIS

Suda Dağılılabilir Granül (WG)

| Grup | C2:7 | C3:11 | Fungisit<br>(Mantar İlacı) |
|------|------|-------|----------------------------|
|------|------|-------|----------------------------|

%25,2 Boscalid + %12,8 Pyraclostrobin

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

**Soluması halinde:** Kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız.

**Yutulması halinde:** Herhangi bir sıvı vermeyiniz. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Tıbbi bakım alınız.

**Cilt ile teması halinde:** Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız

**Göz ile teması halinde:** Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dâhil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Bir uzmana başvurunuz.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114**

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



Net Miktarı:  
Azami per. Satış fiyatı:

#### İÇİNDEKİLER:

Boscalid, Pyraclostrobin

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ:



**UYARI KELİMESİ: DİKKAT**

#### ZARARLILIK İFADELERİ:

**H332** Solunması halinde zararlıdır.

**H315** Cilt tahrişine yol açar.

**H410** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ

**P102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

**P270** Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

**P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

**P304+P340. SOLUNDUĞUNDA:** Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

**P501** İçeriği/kabı 'Atık Yönetimi Yönetmeliği' uyarınca bertaraf edin.

**EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

#### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

#### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolaması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

Sedef YÜCEL TEKÖĞLU  
Yüksek Kimyager

TARKİM BİTKİ KORUMA  
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

03 Mart 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KONTROL EDİLMİŞTİR

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.

**EFDAL JOVIS**

Suda Dağılıbilir Granül (WG)

| Grup | C2:7 | C3:11 | Fungisit<br>(Mantar İlacı) |
|------|------|-------|----------------------------|
|------|------|-------|----------------------------|

**%25,2 Boscalid + %12,8 Pyraclostrobin****ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:**

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114**Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.**RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:**TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.  
Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:287 MANİSA  
Tel: 0 236 2340909 pbx.  
Çağrı Merkez:4443150  
Faks: 0 236 2379645  
www.tarkimbk.com.trSedef YÜCEL TEKOĞLU  
Yüksek Kimyager  
TARKİM BİTKİ KORUMA  
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:****Elma karalekesi, Armut karalekesi:**

1. **Uygulama:** Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. **Uygulama:** Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce)
3. **Uygulama:** Çiçek taç yapraklarının %70-80'i dökülünce
4. **ve diğer uygulamalar** ise ekolojik koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12- 14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

**Elma küllemesi:**

1. **Uygulama:** Pembe çiçek tomurcuğu döneminde
2. **Uygulama:** Çiçek taç yapraklarının %60-70'i dökülünce
3. **ve diğer uygulamalar:** Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece 12-14 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

**Ayva monilyası:**

1. **Uygulama:** Çiçeklerin %5 açtığı dönemde
2. **Uygulama:** Çiçeklerin %50' si açtığı dönemde
3. **Uygulama:** Tam çiçeklenme döneminde yapılmalıdır.

**Kayısı, Şeftali, Kiraz/Vişne çiçek monilyası:**

1. **ilaçlama:** Çiçeklenme başlangıcında (Çiçeklerin %5-10'u açtığı dönemde)
2. **ilaçlama:** Tam çiçeklenmede (Çiçeklerin %90-100'ü açtığı dönemde) yapılmalıdır.

**Kiraz / Vişne meyve monilyası:**

Meyvelere ben düştüğünde tek bir uygulama yapılmalıdır.

**Nohut antraknozu:**

Uygulamaya ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle başlanır. Hastalık şiddeti ve iklim koşulları göz önüne alınarak 10 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilir

**Antepfıstığı karazenk:**

İlk ilaçlama, hastalık belirtileri görüldüğünde çiçek dökümünden sonra, döllenmeyi takiben meyvelerin buğday tanesi büyüklüğüne ulaştığı devrede yapılmalıdır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre 14 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir,

**Nar kahverengi leke hastalığı:**

1. **ilaçlama:** Çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığı dönemde
2. **ilaçlama:** Taç yapraklar döküldüğünde
3. **ilaçlama:** Meyveler yarı büyüklüğe gelince yapılır.

**Mandarin kahverengi leke hastalığı:**

Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvelerin hastalıktan korunması için 14 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir. İlaçlamalara sürgün gelişmesinin durduğu yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:** EFDAL JOVIS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C2:7 / C3:11 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bir bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL JOVIS' in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C2:7 / C3:11 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:** Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KONTROL EDİLMİŞTİR

03 Mart 2023

M. K.