

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj No:  
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 02.07.2021 / 11963

**KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:**

| Bitki adı      | Zararlı organizma adı                                       | Uygulama dozu     | Son uygulama ile hasat arasındaki süre |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Domates (Sera) | Patlıcangillerde külleme ( <i>Leveillula taurica</i> )      | 125 ml / 100 l su | 3 gün                                  |
| Biber (Sera)   | Patlıcangillerde külleme ( <i>Leveillula taurica</i> )      | 125 ml / 100 l su | 3 gün                                  |
| Hıyar (Sera)   | Külleme ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )                   | 100 ml / 100 l su | 3 gün                                  |
| Buğday         | Sarı pas ( <i>Puccinia striiformis</i> )                    | 75 ml/da          | 56 gün                                 |
|                | Tahıl küllemesi ( <i>Erysiphe graminis</i> )                | 75 ml/da          |                                        |
|                | Buğdayda septorya yaprak lekesi ( <i>Septoria tritici</i> ) | 75 ml/da          |                                        |

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:** Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:** Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:**

**Domates (sera), Biber (sera) Patlıcangillerde Külleme:** Uygulamalar serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Bir sezonda azami 3 uygulama yapılmalıdır.

**Hıyar (sera) Kabakgillerde Külleme:** İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşullarına ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya 12-14 gün ara ile devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 °C'nin üstünde ve orantılı neminde %50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilir. Bir sezonda azami 3 uygulama yapılmalıdır.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



## EFDAL KAMP 320 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

| Grup | G1:3 | C3:11 | Fungisit (Mantar ilacı) |
|------|------|-------|-------------------------|
|------|------|-------|-------------------------|

200 g/l Tebuconazole + 120 g/l Azoxystrobin

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının ¼ üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

**ZEHRİLENME BELİRTİLERİ:** Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

**İLYARDIM ÖNLEMLERİ:**

**Solunması halinde:** Kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız.

**Yutulması halinde:** Herhangi bir sıvı vermeyiniz. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Tıbbi bakım alınız.

**Cilt ile teması halinde:** Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız

**Göz ile teması halinde:** Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dâhil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Bir uzmana başvurunuz.

**ULUSAL ZEHRİ DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114**

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Tarkim Kredi Kooperatifleri şirkettir.

Net Miktarı:  
Azami per. Satış fiyatı:

**İÇİNDEKİLER:** Tebuconazole, Azoxystrobin

**ZARARLILIK İŞARETLERİ:**



**UYARI KELİMESİ: DİKKAT**

**ZARARLILIK İFADELERİ:**

**H302:** Yutulması halinde zararlıdır.  
**H361d:** Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.  
**H332:** Solunması halinde zararlıdır.  
**H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

**ÖNLEM İFADELERİ**

**P102:** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.  
**P270:** Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.  
**P280:** Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.  
**P308 + P313:** Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.  
**P391:** Döküntüleri toplayın.  
**P501:** İçeriği/kabı 'Atık Yönetimi Yönetmeliği' uyarınca bertaraf edin.  
**EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

**DEPOLAMA DURUMU:** Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:** Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolaması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

30 Kasım 2022  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



**TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
Organize Sanayi Bölgesi, Tuzlukçu Cd. No:287 Sebzeaderler MANİSA  
Tic. Sic. No: 236 231 09 99 Pht Fax: 0 236 237 96 45  
Tic. Sic. No: 12122  
Mersis No: 0824 0301 0010 0012 www.tarkimbitki.com.tr

**Barış SÜREL**  
Ziraat Yüksek Mühendisi



**Buğdayda Sarıpas:** Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 21-28 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

**Buğdayda Tahıl küllemesi:** Külleme hastalığının belirtileri uygun koşullarda her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksama bitki koruma ürünü uygulamasına başlanmalıdır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa (21 gün aralıklarla) ikinci uygulama yapılabilir.

**Buğdayda Septorya yaprak lekesi:** İklim koşulları hastalığın gelişimine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması yapılır. Hastalık belirtileri ilk görüldüğünde uygulamalara başlanır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşık ve başaklanma döneminde yağışlı havalarda devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir. Gerekli görüldüğü hallerde (21 gün aralıklarla) ikinci bir uygulama yapılmalıdır.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:** EFDAL KAMP 320 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 / C3:11 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL KAMP 320 SC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1 :3 / C3:11 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:** Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



## EFDAL KAMP 320 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

| Grup | G1:3 | C3:11 | Fungisit<br>(Mantar İlacı) |
|------|------|-------|----------------------------|
|------|------|-------|----------------------------|

200 g/l Tebuconazole + 120 g/l Azoxystrobin

### ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114**

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:287 MANİSA

Tel: 0 236 2340909 pbx.

Çağrı Merkez:4443150

Faks: 0 236 2379645

www.tarkimbk.com.tr

**TARKİM BİTKİ KORUMA  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Turgut Özal Mah. Turgutlu C. No:287 Turgutlu/Manisa

Tel: 0 236 234 09 09 PBX Fax: 0 236 237 96 45

Mesir V.D. 821030 1067 Tic. Sic. No: 12533

Barış SÜREL  
Ziraat Yüksek Mühendisi

30 Kasım 2022  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

