

İmal tarihi:
Son kullanma tarihi:
Şarj numarası
Ruhsat tarihi ve numarası: 29.06.1995/ 2829

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Sebze Fideleri	Sebze fidelerinde çökerten (<i>Phythium spp</i> , <i>Rhizoctonia spp</i> , <i>Fusarium spp</i> , <i>Alternaria spp</i> , <i>Sclerotinia spp</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)	200 g / 100 kg tohum	14 gün
Kavun, Karpuz	Kabakgillerde antraknoz (<i>Coletotrichum orbiculare</i>)	300 g / 100 kg tohum	--
Nohut	Antraknoz (<i>Ascochyta rabiei</i>)	300 g / 100 kg (tohum uygulaması)	14 gün
Soğan	Sürme (<i>Urocystis cepulae</i>)	5 kg / 100 kg arpacık tohum	--

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLAMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde Uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL KİMAR SOL

İSLANABİLİR TOZ (WP)

GRUP	M: 3	Fungisit (Mantar ilacı)
------	------	-------------------------

%80 Thiram

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma Sonrası: Solunması halinde, kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız.
Yutma Sonrası: Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Ağız suyla çalkalayınız. Doktora danışınız.
Cilt Teması Sonrası: Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız.
Göz Teması Sonrası: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dâhil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Bir uzmana başvurunuz.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri iştirakidir.

Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER

Thiram

ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ: (H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır
H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki
EUH208: Thiram içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ: (P)

P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanınız.
P301+312: YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P501 İçeriği/kabı 'Atık Yönetimi Yönetmeliği' uyarınca bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir. Akarsulara bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Boş ürün ambalajlarını başka maksatlar için kullanmayınız.
- Uygulamaya koruyucu olarak başlanmalı ve bitkiler kaplama olarak ilaflanmalıdır.

Sedef YÜCEL TEKOĞLU
Yüksek Kimyager
T.C. BİTKİ KORUMA
VE TİCARET A.Ş.

27 Ağustos 2020

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:**Sebze fidelerinde çökerten**

Tohum ilaçlaması; Ekimden önce tohuma uygulanır.

Kabakgillerde antraknoz (Kavun, Karpuz)

Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohumlar 1 saat süreyle ıslatılıp, 1 saat kurutulduktan sonra uygulanmalıdır.

Nohut antraknozu

Tohum ilaçlaması: Ekimden 3-4 saat önce nohut tohumları bir saat süreyle su içerisinde ıslatıldıktan sonra yarım saat müddetle bir sergi üzerine yayılarak havalandırılmalı ve gerekli miktar bitki koruma ürünü ile karıştırılarak ekilmelidir.

Soğan sürmesi

Tohum ilaçları tohumlar hafifçe nemlendirildikten sonra kapalı bir kaptaki iyice karıştırılır ve ekilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

EFDAL KİMAR SOL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M: 3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **EFDAL KİMAR SOL**'un aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M: 3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılmalıdır.

(Bakırlı fungusitlerle karıştırılmaz. Bitkilere bakırlı bitki koruma ürünü uygulanmışa hemen ardından Thiram etkili maddeli bitki koruma ürünü tatbikatı yapılmamalıdır. Bakırlı bitki koruma ürünü tatbik edilmişse aradan 2 haftalık bir sürenin geçmesi beklenmelidir.)

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.

**EFDAL KİMAR SOL**

İSLANABİLİR TOZ (WP)

GRUP	M: 3	Fungisit (Mantar İlacı)
------	------	-------------------------

%80 Thiram

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarım Kredi
Kooperatifleri iştirakidir.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Turgutlu yolu 9.km

MANİSA

Tel: 0 236 2340909 pbx.

Faks: 0 236 2379645

www.tarkimbk.com.tr

Sedef YÜCEL TEKÖĞLU
Yüksek Kimyager

TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

27 Ağustos 2020
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

