

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat tarihi ve no. su: 31.01.2020 / 11568

TarKim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMALAR	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Arpa	Fide Yankılığı, Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü (<i>Fusarium spp., Rhizoctonia spp.</i>)	200 ml/da	56 gün
Buğday	Tahıl külemesi (<i>Erysiphe graminis</i>)		
	Tahıl fide yankılığı, Kök, Kök Boğazı Çürüklüğü (<i>Fusarium culmorum, rhizoctonia cerealis</i>)	200 ml/da	56 gün
Çeltik	Çeltik Yankılığı (<i>Pyricularia oryzae</i>)	200 ml/da	56 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden laçlı su depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama amamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

ALIBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamaların günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sisteminin çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Buğdayda tahıl külemesi: Külleme hastalığının belirtileri uygun koşullarda her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyrini izlemeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla buluşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır.

Buğdayda Fide Yankılığı, Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü hastalıkları: Hastalık ilk görüldüğünde uygulamaya yapılmalıdır. Uygulama kardeşlenme ile bayrak yaprak arasındaki devrede yapılmalıdır. **Arpada Fide Yankılığı, Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü hastalıkları:** Hastalık ilk görüldüğünde yapılmalıdır. Uygulama kardeşlenme ile bayrak yaprak arasındaki devrede yapılmalıdır.

EPDAL KLORMET DC buğday ve arpada en az 30 gün süreyle koruyuculuk sağlamaktadır. Uygulamadan 30 gün sonra hastalık korulan devam ediyor. İkinci bir uygulama yapılabilir.)

Çeltikte Çeltik Yankılığı: Yeşil aksam ilaçlaması olarak hastalık belirtileri ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Gerektiği hallerde hava şartlarına bağlı olarak 30 gün sonra ikinci uygulama yapılabilir.

01 Nisan 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR

Dr. Neshin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

EPDAL KLORMET DC

Disperse Olabilen Konsantre (DC)

GRUBU	G1.3	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
150 g/l Prochloraz + 42 g/l Epoxiconazole		

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün buhar ve/veya zerrecikleri solunmayınız.
- Maskesi, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edilen şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulamaya tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma: Temiz havaya çıkartınız. Gerekli ise suni solunum yapınız. Doktora başvurunuz.

Yutma: Herhangi bir sıvı vermeyiniz. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Tıbbi bakımı alınız.

Cilt teması: Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız.

Göz teması: Tedbir olarak gözleri su ile yıkayınız.

Ağız yoluyla alma bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Ağız suyla çalkalayınız. Doktora danışınız.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

TarKim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

Ek-I

İÇİNDEKİLER:

Prochloraz, Epoxiconazole

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

- H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
- H302 + H332: Yutulduğunda, ciltle temas ettğinde veya solunduğunda zararlıdır.
- H360FD: Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.
- H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

- P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
- P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
- P308 + P313: maruz kalınma veya etkileşme halinde ise: tıbbi yardım / bakım alın.
- P391: Döküntüleri toplayın.
- P405: Kilit altında saklayın.
- P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
- EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Airlara zehirlidir. Çeşkenme zamanında kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına buluşturmaktan kaçınınız.
- Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için ilgili önerilere muhakkak uyunuz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörüsü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

Seder YÜCEL TEKOĞLU

Yüksek Yönetim Kurulu Başkanı

TARİKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

EFDAL KLORMET DC isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu G1,3 olarak sınıflandırılmış bir fungustür. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL KLORMET DC'nin aynı ayım üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1,3 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösterin.

KARŞILILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL KLORMET DC

Disperse Olabilen Konsantre (DC)

GRUBU	G1,3	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
150 g/l Prochloraz + 42 g/l Epoxiconazole		

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FIRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:287 MANİSA
Tel:0 236 2340909 pbx. Faks: 0 236 2379645
www.tarkimbk.com.tr

Sedat YÜCEL TEKOĞLU
Yüksek Kimyager

TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01 Nisan 2024
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

