

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarihi ve Numarası:

KULLANILACI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR			
Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
PATLICAN (Tarla, sera)	Patlıcangillerde külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	20 ml/da	3 gün
BİBER (Sera)	Patlıcangillerde külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	20 ml/da	3 gün
KARPUZ	Kabakgillerde külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	20 ml/da	1 gün
KAVUN	Kabakgillerde külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	25 ml/da	1 gün
KABAK	Kabakgillerde külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	25 ml/da	3 gün
DOMATES (Tarla, sera)	Patlıcangillerde külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	20 ml/da	3 gün
BAĞ * (Üzüm)	Bağ küllemesi (<i>Erysiphe necator</i>)	20ml/100 L su	28 gün
HIYAR (Sera)	Kabakgillerde külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	20ml/100 L su	1 gün
KORNIŞON (Sera)	Kabakgillerde külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	20ml/100 L su	1 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

Metrafenone, koruyucu ve önleyici etkiye sahip Benzophenone grubunun ilk aktif maddesidir. Yaprak kütikulasından kolayca ve hızlı bir şekilde alınmakta, yaprak dokusu içerisinde bitki koruma ürününün değdiği bölgenin altında toplanmaktadır. Uygulanan bitki koruma ürününün çok az kısmı yaprak içerisinde hareket edebilmektedir ve bu miktarda hastalıktan korunmaya yetmektedir. Hastalığın yaprağa bulaşmasını, nüfuz etmesini, misel ve spor gelişimini önler. Yoğun olarak uygulama yapılan bölgelerde direnç oluşumuna karşı, etki şekli farklı bitki koruma ürünleri ile alternatifli kullanılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



tarkim

EFDAL NYMERIA

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	U8	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
-------	----	-------------------------

500 g/l Metrafenone

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız.
Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen tedbirleri alınız. Doktor çağırınız. Bitki koruma ürünün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Solunması halinde: Solunduğu takdirde temiz havaya çıkartınız. Soluma, yutma ya da temas halinde tıbbi yardım alınız ve mümkünse yanınızda ilacın etiketini ya da güvenlik bilgi formunu bulundurunuz.

Yutulması halinde: Derhal ağzınızı su ile çalkalayın ve ardından 200-300 ml su için, doktora başvurunuz.

Cilt ile teması halinde: Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız.

Göz ile teması halinde: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dâhil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Bir uzmana başvurunuz.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



Net Miktarı:
Azami per. Satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:
Metrafenone

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H411: Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için zehirlidir.

ÖNLEM İFADELERİ:

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.

P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu /yüz koruyucu kullanınız.

P308 + P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

P391: Döküntüleri toplayınız.

P501: İçeriği/kabı 'Atık Yönetimi Yönetmeliği' uyarınca bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Ürünü, orijinal ambalajı içinde, ağzı sıkıca kapalı olarak, gıdalardan uzakta, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde, kilit altında muhafaza ediniz.

DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Tic. Sic. No: 28100, T. Kurumları CA, No: 28100, S. No: 28100, M. No: 28100
Tic. Sic. No: 28100, T. Kurumları CA, No: 28100, S. No: 28100, M. No: 28100
Tic. Sic. No: 28100, T. Kurumları CA, No: 28100, S. No: 28100, M. No: 28100
Tic. Sic. No: 28100, T. Kurumları CA, No: 28100, S. No: 28100, M. No: 28100

Baş SÜREL
Ziraat Yüksek Mühendisi

24 Ekim 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

2022

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağda külleme:

1. **uygulama:** Çiçekten önce sürgünler 25–30 cm boya erişince,
2. **uygulama:** Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,
3. **uygulama:** Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,
4. **ve diğer uygulamalar:** Üçüncü uygulamadan sonra 14 gün ara ile, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Domates (Tarla, sera), Patlıcan (Tarla, sera) ve Biber (sera) Patlıcangillerde külleme: Uygulamalar serada/tarlada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 10 – 14 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

Hıyar (Sera), Kornişon (sera), Kabak, Karpuz ve Kavun Kabakgillerde Külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti ve iklim koşullarına bağlı olarak 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 °C' nin üstünde ve orantılı neminde %50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL NYMERIA isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre (Grup U8) olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL NYMERIA'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup U8 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL NYMERIA

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	U8	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
-------	----	-------------------------

500 g/l Metrafenone

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



FİRMA BEYANI: Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolaması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:287 MANİSA
Tel: 0 236 2340909 pbx.
Çağrı Merkez:4443150
Faks: 0 236 2379645
www.tarkimbk.com.tr

**TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**

Yatırım Mh. Turgutlu Cd. No:287 S.Çayırbaşı MANİSA
T.C. 06234 09 09 09 pbx Faks: 0 236 237 96 45
Tic. Sic. No: 894 020 1097 Tic. Sic. No: 12122
Tic. Sic. No: 0623 0301 0670 0012 www.tarkimbk.com.tr

Barış SÜREL
Ziraat Yüksek Mühendisi

24 Ekim 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

