

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Şarj No:

Ruhsat tarihi ve no. su:

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Kullanma dozu ve dönemi	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
ELMA	Avrupa Kırmızıörümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	50 gr / 100 l suya (Larva, Nimf, Ergin)	21 gün
	İki Noktalı Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	75 gr / 100 l suya (Larva, Nimf, Ergin)	
DOMATES (SERA)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	100 gr / 100 l suya (Larva, Ergin)	3 gün
	Domates pasakarı (<i>Acuallops lycopersici</i>) Larva, Ergin	75 gr / 100 l suya (Larva, Ergin)	

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemlerini su kaynaklarının yanında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma – İki noktalı kırmızıörümcek ve Avrupa kırmızıörümceği: Mayıs ayından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Domates (sera) – Tütün beyazsineği: Beyazsinek ile buluştuğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her baş adımda bir alt, orta ve üst yapraklarından olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva + pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Domates (sera) – Domates pasakarı: Bitkilerin özellikle toprağa yakın kısımlarını inceleyerek, pas rengini alan bitkilerde yaprak örnekleri alınır. Yapraklar stereo binoküler mikroskop altında incelenerek zararlı aranır. Zararlıların görüldüğü bitkiler ve çevresinde lokal uygulama yapılır. Her hafta 10 gün aralıklarla bitkiler inceler ve yayılması halinde tüm alana uygulama yapılır.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL PİRDEN 20 WP

İslanabilir Toz (WP)

GRUBU	21 A	AKARİSİT (Kırmızıörümcek ilacı)
		%20 Pyridaben

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Maske, koruyucu elbise, eldiven, gözlük kullanınız.
- Bitki koruma ürününün uygulanması esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süre ile insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Göz bebeklerinde büyüme, adalelerde konsantrasyon bozukluğu ve kaslarda kasmaya neden olur.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Soluma: Solunduğu takdirde temiz havaya çıkartınız. Soluma, yutma ya da temas halinde tıbbi yardım alınız ve mümkünse yanınızda ilacın etiketini ya da güvenlik bilgi formunu bulundurunuz.

Yutma: Herhangi bir sıvı vermeyiniz. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Tıbbi bakım alınız.

Cilt teması: Cildi hemen en az 15 dakika süreyle bol su ile yıkayınız. Ürünün bulaştığı giysi ve ayakkabıları hemen çıkarınız. Belirtiler artarsa tıbbi yardım alın.

Göz teması: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dâhil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Bir uzmana başvurunuz.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



14 Subat 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı:

Azami per. Satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

Pyridaben

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H301: Yutulması halinde toksiktir.

H331: Solunması halinde toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisli/buhanını/spreyini solumaktan kaçınınız.

P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

P301+P312: Yutulduğunda: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayınız.

P501: İçeriği/kabı "Atık Yönetimi Yönetmeliği" uyarınca bertaraf ediniz.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- Tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
- Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
- Kullanmadan önce ilaçlama aletini kalibre ediniz.
- İlacı kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak, serin, kuru ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
- Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız.
- Usulüne göre imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

Şirket Vekili
Burak KİŞİN

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

EFDAL PİRDEN 20 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 21/A olarak sınıflandırılmış bir akarısittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL PİRDEN 20 WP'nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 21/A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Bordo bulamaç ile karıştırmaz. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.

**EFDAL PİRDEN 20 WP**

Islanabilir Toz (WP)

GRUBU	21 A	AKARİSİT (Kırmızıörümcek ilacı)
		%20 Pyridaben

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Turgutlu yolu 9.km MANİSA
Tel: 0 236 2340909 pbx. Faks: 0 236 2379645
www.tarkimbk.com.tr

ANTİDOTU VE TEDAVİ:

Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



14 Subat 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

TARIM BİTKİ KORUMA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Şirket Vekili
Burak Kişin