

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat tarihi ve no.su: 11.07.2012 / 8778

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
AYÇİÇEĞİ	Ayçiçeği mildiyösu (<i>Plasmagora helianthi</i>)	500 ml/100 kg tohum	---
HIYAR (Tarla)	Kabakgillerde mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	250 ml/ da	3 gün
KORMIŞON (Tarla)	Kabakgillerde mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	250 ml/ da	3 gün
PATATES	Patates mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	250 ml/ da	3 gün
TÜTÜN (Fidelik)	Tütün fidelerinde çökerten (<i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Alternaria spp.</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	7,5 ml/m ² (3-4 L su ile)	3 gün
DOMATES (Sera)	Mildiyö (<i>Phytophthora</i>)	250 ml/100 L su	3 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu varıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden karışımı su depoya ilave edilir. Karışımaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

Tohum uygulaması için: Tohum uygulama işlemi döner uygulama bidonu veya tohum püskürtme prensibi ile çalışan tohum uygulama makinesi ile yapılabilir. Uygun ekipman bulunmaması durumunda tohumlar düz bir zemin üzerine yayılarak homojen bir kaplama sağlayacak şekilde uygulama yapılır. Bitki koruma ürünü uygulanmış bir tohum evvelce yapılmış mibzer avarını değiştirileceğinden ekinden önce karışımı tohum ile mibzer avarının tekrar yapılması tavsiye edilir. Kullanıktan sonra uygulama aletinin iyice temizlenmesi gerekir.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

27 Nisan 2012

GIDA VE KENTLİ HAYAT BAKANLIĞI

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



tar'kim

EFDAL PROCAR 722 SL

Suda Çözünen Konsantre (SL)

GRUBU	F 4:28	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
-------	--------	-------------------------

722 g/L Propamocarb-HCl

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan ve gıda ve hayvan yemlerinde uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulaması esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara içmeyiniz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya ilaçlamadan sonra insan ve hayvan girmesinde sakınca yoktur.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI

KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine %üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, göz kararması, ateş vb.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluması halinde: kazazedeği açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız.

Yutulması halinde: Bilingsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Ağız suyla çalkalayınız. Doktora danışınız.

Cilt ile temas halinde: Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız.

Göz ile temas halinde: Tedbir olarak gözlere su tutunuz.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri işbirliğidir.



Net Miktarı
Azami per. Satış fiyatı

İÇİNDEKİLER: Propamocarb-HCl



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ: (H)

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ: (P)

P260: Tozunu/ dumanını/ gazını/ sisini/ buharını/ spreyini solumayın.

P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu /yüz koruyucu kullanın.

P303+P361+P353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirilenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.

P501: İçeriği/kabı 'Atık Yönetimi Yönetmeliği' uyarınca bertaraf edin.

EUHD001: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir, su kaynaklarına, göllere, akarsulara bulandırmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Bitki koruma ürününün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Rüzgarlı havada uygulama yapmayınız.
- Bitki koruma ürününü ambalajında, kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boş ambalajları başka bir amaç için kesinlikle kullanmayınız.

TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Teşvikiye Bulvarı, Beşiktaş (İl. No: 287) Şişli/İstanbul 34398

Tel: 0 212 221 00 00 Faks: 0 212 221 06 11

Branş: 0 212 221 00 00 Tel: 0 212 221 06 11

Telex: 34 0021 KİM T

Barış SUREL
Ziraat Yüksek Mühendisi

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yüksek suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIMA ŞEKLİ

Ayıçağı milidyosu:

Uygulama ekimden önce tohum uygulaması şeklinde yapılır. Sıvı bir bitki koruma ürünü olup gerek toz gerekse sıvı formülasyonlu preparatların 100 kg tohum için önerilen karışım miktarı 1-1,5 L su içerisinde çözündürülür ve sonrasında su bütün tohumu homojen olarak dağıtır.

Kabakgillerde milidyö (Hıyar, Kornişi):

Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk milidyö belirtilişinin görülmesi ile uygulamaya başlar ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafına, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Patates milidyö:

Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları olduğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

Domates milidyö:

Kimyasal mücadele için çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz küllü gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Tütün fideliklerinde çöberten:

Tütün fideliklerinde tohum atıldıktan hemen sonra toprak hafif nemlendirilir. Sonra bitki koruma ürünü uygulaması yapılır. 25-30 gün sonra uygulama tekrarlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

EDAL PROCAR 722 SL, isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grubu F 4:28** olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **EDAL PROCAR 722 SL**'i aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup F 4:28 hariç**) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

EDAL PROCAR 722 SL, diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan ön karışım denemesi yapılmamalıdır. Tohum uygulaması olarak kullanıldığında hiçbir bitki koruma ürünü ile karıştırılmadan tek başına kullanılabilmektedir.

M. S. T.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GENEL KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

27 Nisan 2022

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL PROCAR 722 SL

Suda Çözünen Konsantre (SL)

GRUBU F 4:28 FUNGİSİT (Mantar İlacı)

722 g/L Propamocarb-HCl

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TELİ 114



Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri İştraktir.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firma ilaalarının kalitesini garanti eder; fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, uygulama hataları, tavsiye uymadaki eksiklikler ve depolamadaki hatalardan dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:287 MANİSA

Tel: 0 236 2340909 pbx. Faks: 0 236 2379645

www.tarkimbk.com.tr

**TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

İmza Yetkili: Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:287 MANİSA
Tic. Sic. No: 2340909 pbx. Faks: 0 236 2379645
Tic. Sic. No: 2379645
Tic. Sic. No: 2379645

Barış SÜREL
Ziraat Yüksek Mühendisi

[Signature]