

İmali Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarihi ve Numarası:

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.

tarkim
EFDAL REMİ WG
Suda Dağılılabilen Granül (WG)

GRUBU	4A	3A	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
-------	----	----	--------------------------

%10 Acetamiprid + %3 Lambda-cyhalothrin

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Hareketlerde yavaşlık, adale kasmaları, denge bozukluğu, solunum azalışı, gözyaşı ve sümkük artışı. Mukozayı tahriş eder.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: Zehirlenme anında aşağıda belirtilen tedbirleri alınız. Doktor çağırınız. Bitki koruma ürünün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Soluması halinde: Kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız.

Yutulması halinde: Herhangi bir sıvı vermeyiniz. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Tıbbi bakım alınız.

Cilt ile teması halinde: Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız.

Göz ile teması halinde: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dâhil olmak üzere en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Tıbbi bakım alınız.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



23-08-2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı:
Azami per. Satış fiyatı:

Ek-2

İÇİNDEKİLER: Acetamiprid, Lambda-cyhalothrin

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: Dikkat

ZARARLILIK İFADELERİ:

H301: Yutulması halinde toksiktir.
H312 + H332: Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz veya sigara içmeyiniz.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.
P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartınız ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutunuz.
P501: İçeriği/kabı "Atık Yönetimi Yönetmeliği" uyarınca bertaraf ediniz.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınız.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Ürünü, orijinal ambalajı içinde, ağız sıkıca kapalı olarak, gıdalardan uzakta, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde, kilit altında muhafaza ediniz.
- Zararlıya temasını sağlayabilmek için yaprakların alt yüzeyleri de dahil olmak üzere bitki koruma ürününün iyi bir kaplama yapacak şekilde püskürtülmesi şarttır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

**TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

İmza: Dr. Nesrin Çakır Arıcan
Tic. Sic. No: 296 234 191 95 15 - Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 296 234 191 95 15 - Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 296 234 191 95 15 - Etiler/Beşiktaş/İstanbul

Barış SUREL
Ziraat Yüksek Mühendisi

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Mısırdaki Mısır Kurdu: 50 dekarlık tarla bir ünite kabul edilir. Tarlada zızzak şeklinde gidilerek 100 bitkideki bulaşma (yumurta kümesi veya yaprak, gövde, koçan, tepe ve koçan püskülündeki yenikler) tespit edilir. Bulaşık bitki sayısı %5 ve üzerinde olması durumunda 14 gün arayla 2 ya da 3 uygulama yapılır.

Antepfıstığındaki Antepfıstığı psilidi: Mayıs ayı ortalarından itibaren haftada 1 kez 100 bileşik yaprakta yapılacak sayılarda 20-30 nimf/yaprak olduğunda ilk parasitoid erginleri çıkmadan ilaçlama yapılır.

Zeytinde Zeytin Güvesi: Zararının tercihen meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki zeytin meyvelerinin %10'unda canlı "yumurta+larva" olması halinde ilaçlama yapılmalıdır. Ancak zararının mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde %10'dan yüksek düzeylerde zarar yapması halinde, çiçek dölünde ilk keleklerin yakanmasından 7-10 gün sonra ilaçlama yapılmalıdır.


Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

f x

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL REMİ WG isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre (Grup 4A ve 3A) olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL REMİ WG'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 4A ve 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.


tarkim
EFDAL REMİ WG

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

GRUBU	4A	3A	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
-------	----	----	--------------------------

%10 Acetamiprid + %3 Lambda-cyhalothrin

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:287 MANİSA
Tel: 0 236 2340909 pbx. - Çağrı Merkez:4443150
Faks: 0 236 2379645 - www.tarkimbk.com.tr



**TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Turgut Özal Mah. Turgutlu C. No:287 Sektör:15 MANİSA
Tel: 0 236 2340909 pbx. Faks: 0 236 2379645
Çağrı M. 444 31 50 T. 12122
Mersis No: 0821 0001 0017 0012 www.tarkimbk.com.tr

Barış SÜREL
Ziraat Yüksek Mühendisi

Ek-2

f j


Dr. N. Arıcan
Daire Başkanı

23-08-2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.