

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 20.09.2021 / 12058

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR			
Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ*	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	50 g / 100 L su	7 gün
Domates	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	60 g / 100 L su	7 gün
Biber (Sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	60 g / 100 L su	7 gün
Hıyar (Sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	60 g / 100 L su	7 gün
Kornişon (Sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	60 g / 100 L su	7 gün
Kiraz	Sert çekirdekli meyvelerde Çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i>)	35 g / 100 L su	7 gün
Çilek	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	60 g / 100 L su	7 gün
Patlıcan (Sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	60 g / 100 L su	7 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

EFDAL SAVAGE sistemik ve kontak özelliklere sahip bir fungisittir. Bileşimine giren iki etkili maddeden biri olan "Cyprodinil" methionin biyosentezini engeller; Cyprodinil yapraklar ve meyveden süratle bünyeye alınır, bitkide yukarıya doğru ve yaprağın bir yüzünden diğer yüzüne iyi bir şekilde taşınır. Diğer etkili madde "Fludioxonil" kontak etkili olup, esas itibarıyla konidilerin çimlenmesini ve fungus miselinin penetrasyonunu engeller.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL SAVAGE

Suda Dağılılabılır Granül (WG)

Grubu	D1:9	E2:12	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	------	-------	-------------------------

%37,5 Cyprodinil + %25 Fludioxonil

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHRİLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Solunması halinde: Kazazedeği açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız.

Yutulması halinde: Herhangi bir sıvı vermeyiniz. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Tıbbi bakım alınız.

Cilt ile teması halinde: Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız.

Göz ile teması halinde: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dâhil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Bir uzmana başvurunuz.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Net Miktarı:
Azami per. Satış fiyatı:

Ek-1

İÇİNDEKİLER:
Cyprodinil, Fludioxonil

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501: İçeriği/kabı 'Atık Yönetimi Yönetmeliği' uyarınca bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Ürünü, orijinal ambalajı içinde, ağzı sıkıca kapalı olarak, gıdalardan uzakta, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde, kilit altında muhafaza ediniz.
- +35°C'nin üzerinde ve 5°C'nin altında depolamayınız. İlaç imal tarihinden itibaren, serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında fiziki ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl muhafaza eder.

23 Şubat 2024
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



**TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

İzmir Atatürk Mh. Torunlar Cd. No:287 Söğütözü - MİTİSİ
Tic. Sic. No: 236 234 09 09 Plak. No: 236 234 09 16
Tic. Sic. No: 824 030 1067 Tic. Sic. No: 1212
Tic. Sic. No: 0824 0301 0670 0012 www.tarkim.com.tr

Barış SÜREL
Ziraat Yüksek Mühendisi



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ІШІ АТҚА
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ІШІ АТҚА
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ІШІ АТҚА

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Bağ Kurşuni küf:

Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde;

1. uygulama: Tanelerin olgunluk başlangıcında,
 2. ve diğer uygulamalar: Kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak (21 gün ara ile) yapılmalıdır. Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.
- Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgelerinde;**

1. uygulama: Çiçeklenmeden hemen önce,
2. uygulama: Kapalı salkım döneminde,
3. ve diğer uygulamalar: Kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak (21 gün ara ile) yapılmalıdır. Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

Domates-Kurşuni küf: Uygulamalara çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme evresinde iken başlanmalı, 10 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılmalıdır.

Biber (Sera)- Kurşuni küf: Uygulamalara ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır, hastalığın seyrine göre 10 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılır.

Hıyar (Sera), Kornişon (Sera)- Kurşuni küf: Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etki süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Bitkinin yeşil aksamını kaplayacak şekilde, havanın serin ve rüzgarsız olduğu zamanlarda 10 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.

Çilek - Kurşuni küf:

1. uygulama: İlk çiçeklerin %10'u açılınca,
 2. uygulama: Çiçeklerin %50'si açınca,
 3. uygulama: İlk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılmalıdır.
- Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir.

Kiraz - Sert çekirdekli meyvelerde Çiçek monilyası:

1. uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte),
2. uygulama: Tam çiçeklenme döneminde (%90-100 çiçekte) yapılır.

Bitki tahammülü: Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında tavsiye edildiği kültür bitkileri üzerinde herhangi olumsuz bir etkisi yoktur. Tereddüt halinde, hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: Efdal Savage isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre grup D1:9 ve E2:12 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmalarına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için. Efdal Savage aynı üretim sezonu içinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız, uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (D1:9 ve E2:12 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz,

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL SAVAGE

Suda Dağılıbilir Granül (WG)

Grubu	D1:9	E2:12	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	------	-------	----------------------------

%37,5 Cyprodinil + %25 Fludioxonil

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajda depolandığında 3 yıl süre ile bitki koruma ürününün biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları c

Ek-1

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolaması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:287 MANİSA

Tel: 0 236 2340909 pbx.

Çağrı Merkezi: 4443150

Faks: 0 236 2379645

www.tarkimbk.com.tr

**TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:287 Şirazlılar MANİSA

Tel: 0 236 2340909 pbx Fax: 0 236 2379645

Çağrı Merkezi: 4443150 Tel: 0 236 2379645

Faks: 0 236 2379645 E-posta: info@tarkimbk.com.tr

Barış SÜREL

Ziraat Yüksek Mühendisi



23 Eylül 2024
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.