

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat tarihi ve no, su:

06.12.2023/12 932

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Domates (sera)	Kürşüni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	150 g / 100 L su	3 gün
Patlıcan (sera)			
Biber (sera)			
Domates (sera)	Patlıcangillerde küleme (<i>Leveillula taurica</i>)	60 g/100 L su	3 gün
Domates (tarla)	Patlıcangillerde küleme (<i>Leveillula taurica</i>)	100 g/da	3 gün
Hıyar (sera)	Sebzelerde beyaz çürüklük (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	150 g / 100 L su	3 gün
Kornişon (sera)			
Çilek	Kürşüni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	150 g / 100 L su	3 gün
Şeftali	Çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i>)	75 g / 100 L su	7 gün
Kiraz			
Kaynu	Çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i>)	100 g / 100 L su	7 gün
Karpuz	Karpuzda alternarya yaprak yanıklığı (<i>Alternaria cucumerina</i>)	100 g/da	3 gün
Havuç	Küleme (<i>Erysiphe heraclei</i> , <i>Leveillula taurica</i>)	150 g/da	1 gün
Patates	Erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	100 g/da	3 gün
Soğan	Soğan pası (<i>Puccinia porri</i>)	150 g/da	7 gün
Marul	Sebzelerde beyaz çürüklük (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	150 g/da	7 gün
Çim	Toprak kökenli hastalıklar (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i>)	150 g/da	-
Karanfil (sera) (<i>Dianthus caryophyllus</i>) (Süs bitkisi)	Karanfil çökerten (<i>Rhizoctonia spp.</i>)	150 g / 100 L su	-

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

06 Aralık 2023



EFDAL SINGİL WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

GRUBU	C2:7	C3:11	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	------	-------	-------------------------

%26,7 Boscalid + %6,7 Pyraclostrobin

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürünü ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Solunması halinde: Kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız.

Yutulması halinde: Herhangi bir sıvı vermeyiniz. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Tıbbi bakım alınız.

Cilt ile teması halinde: Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız.

Göz ile teması halinde: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dâhil olmak üzere en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Tıbbi bakım alınız.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Dr. Neshin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

Net Miktarı
Azami per. Satış fiyatı

Ek-1

İÇİNDEKİLER: Boscalid, Pyraclostrobin

UYARI İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P501: İçeriği/kabı "Atık Yönetimi Yönetmeliği" uyarınca bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

• Anlara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı uygulamayınız.

• Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmaktan kaçınınız.

• Bitki koruma ürünü kendi ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

• Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

• Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

Sedef YÜCEL TEKÖĞLU
Yüksek Kimyager

TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Patates Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Soğan Pası: Uygulama yeşil aksam uygulaması şeklinde yapılır. Yapraklarda pas püstülleri görülür görülmez uygulamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilmelidir.

Marul Beyaz Çürüklük: Bulaşık olduğu bilinen alanda toprak uygulaması dikimden önce, yeşil aksam uygulaması ise fidelerin çıkartılmasından sonra başlanmalıdır.

Çim Toprak Kökenli Hastalıklar: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre 10 gün ara ile devam edilir.

Karanfil (sera) Çökerten: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlama yapılır. İkinci ve diğer ilaçlamalar hastalığın seyrine göre 10 gün aralıklarla tekrarlanır. Uygulamalar fide diplerine can suyu uygulaması şeklinde yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

EFDAL SINGİL WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu **C2:7** ve **C3:11** olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **EFDAL SINGİL WG**'yi aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup **C2:7** ve **C3:11** harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi Ticaret A.Ş.



EFDAL SINGİL WG

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

GRUBU	C2:7	C3:11	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	------	-------	-------------------------

%26,7 Boscalid + %6,7 Pyraclostrobin

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FIRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET
Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No: 287 MANİSA
Tel: 0 236 234 09 09 pbx,
Faks: 0 236 237 96 45
www.tarkimbk.com.tr

Ek-1

Sedef YÜCEL TEKÖĞLU
Yüksek Kimyager
TARKİM BİTKİ KORUMA
TİCARET A.Ş.

06 Aralık 2023



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Koruyucu ve önleyici etkiye sahip, kontakt, translaminar ve lokal-sistemik olarak çalışan bir fungusittir. Boscalid ve Pyraclostrobin' in etkileri birleştirilerek, yüksek kontrol sağlayan ve iki farklı etki şekline sahip etkili madde içermesiyle direnç yönetimine ve Entegre Zararlı Yönetimi'ne uygun bir ilaç olarak geliştirilmiştir. İyi bir kalıcı etkisi vardır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLAMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Domates (sera)-Patlıcan (sera)-Biber (sera) Kurşuni küf: Çevrede ilk hastaik belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır. Uygulamalar 10 gün arayla yapılmalıdır.

Domates Külleme (Taria/Sera): Uygulamalar tarla ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 10 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

Hıyar (Sera) ve Kornişon (Sera) Beyaz çürüklük: Bulayık olduğu bilinen alanda toprak ilaçlaması dikimden önce, yeşil aksam ilaçlaması ise fidelerin şaşırtılmasından sonra başlanmalıdır.

Çilek Kurşuni küf:

1. Uygulama: İlk çiçeklerin %10'u açınca,
2. Uygulama: Çiçeklerin %50'si açınca,
3. uygulama: İlk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılmalıdır.

Şeftali, Kiraz, Kayısıda Çiçek monilyası:

1. Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte),
2. Uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) Kimyasal ilaçlama yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde uygulanır. Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle uygulamaya başlanmalıdır.

Karpuz Alternarya yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Havuç Külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre 10 gün ara ile devam edilir.

06 Aralık 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Devami Arka Sayfada

Tarkim Bitki Koruma Sanayi Ticaret A.Ş.



EFDAL SINGIL WG

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

GRUBU	C2:7	C3:11	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	------	-------	-------------------------

%26,7 Boscalid + %6,7 Pyraclostrobin

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında depolandığında 2 yıl süre ile kullanıma uygundur. Ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydıyla, imalatçı ürünlerinin kalitesini garanti eder. İmalatçı ürünün uygun olmayan koşullarda depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiye dışı kullanımdan doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Sedef YÜCEL TEKÖĞLU
Yüksek Kimyager
TARKİM BİTKİ KORUMA
TİCARET A.Ş.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı