

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat tarihi ve no. su:

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU
Bağ *	Bağ küllemesi (<i>Erysiphe necator</i>)	400 ml/100 L su
Domates (Sera)	Domateste külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	400 ml/100 L su
Fındık	Fındıkta külleme (<i>Erysiphe spp.</i>)	400 ml/100 L su

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesini deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesini deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Uygulama rüzgarsız havada yapılmalı, bitkinin iyice ıslanmasına ancak ürünün bitkiden akıtılmamasına dikkat edilmelidir. Bağda salkımlarda iyice bitki koruma ürünü uygulanması gerekmektedir.

BAĞ KÜLLEMESİ:

- İlaçlama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,
- İlaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,
- İlaçlama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,
- ve diğer ilaçlamalar: Üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Domateste Külleme: İlaçlı mücadele çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz küllü görülmeleriyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar gerçekleşir gerçekleşmez başlanmalıdır. Mildiyö daha çok yaprakların altında olduğu için ilaçlama sırasında mutlaka yaprak alt yüzeylerinde ve bitkinin her tarafında bir ilaç tabakası oluşturmaya özen göstermelidir.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL SULFUR 800 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	M2	FUNGİSİT (MANTAR İLACI)
-------	----	----------------------------

800 g/l Kükürt

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan ve gıda ve hayvan yemlerinde uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün buhar ve/veya zerrecelerini solamayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünün boş ambalajlarının içine dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Solumun: Solunduğu takdirde temiz havaya çıkartınız.

Yutma: Herhangi bir sıvı vermemeyiniz. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız.

Cilt Teması: Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız.

Göz Teması: Hemen bol miktarda su ile gözkapaklarının altı dahil olmak üzere en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Bir uzmana başvurunuz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı:
Azami per. Satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:
Kükürt

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ: (H)

H315: Cilt tahrişine yol açar

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P332 +P313: Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P353: Cildinizi su/duş ile durulayın.

P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürünü artıklarının akarsu, göl, havuz sularına, çeşme yalaklarına ve su kuyularına bulaşmamasına özen gösteriniz.
- Boş ürün ambalajlarını başka hiçbir gaye için kullanmayınız.
- Usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Kabakgiller ve kayısı kükürde hassastır.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı uygulamayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydıyla firmamız bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlarla uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Metin OCAKTAN

Şirket Vekili

01 Haziran 2020

Fındıkta küllenme: Erysiphe spp. nin neden olduğu küllenme hastalığı bahçede ilk defa çıkıyorsa belirtiler görülür görülmez uygulamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise meyve (çotanak) bağlama döneminde uygulama başlanır. İklim koşulları ve ürünün etki süresi dikkate alınarak ikinci ve diğer uygulamalarda hasada kadar devam edilir. Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Efdal Sulfur 800 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M2 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Efdal Sulfur 800 SC 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Yazlık ve kışlık yağlarla karıştırılmaz. Diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapılacaksa karışımların bir ön karışım yaparak denenmesinde fayda vardır.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL SULFUR 800 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	M2	FUNGİSİT (MANTAR İLACI)
-------	----	----------------------------

800 g/l Kükürt

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FIRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Turgutlu yolu 9.km MANİSA
Tel:0 236 2340909 pbx. Faks: 0 236 2379645
www.tarkimbk.com.tr

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Metin OCAKTAN
Şirket Vekili

01 Haziran 2020