

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Şarj No:

Ruhsat tarihi ve no. su: 07.05.2019 / 11374

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (Sera)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 ml/ 100 L su (Larva, pupa)	7 gün
Şeftali	Dut kabuklubiti (<i>Pseudaulacacaspis pentagona</i>)	50 ml/ 100 L su (Larva)	14 gün
Patlıcan (Tarla)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 ml/da (Larva, pupa)	3 gün
Biber (Sera)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 ml/ 100 L su (Larva, pupa)	7 gün
Pamuk	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 ml/da (Larva, pupa)	28 gün
Zeytin	Zeytin karakoşnili (<i>Saissetia oleae</i>)	50 ml/ 100 L su (Larva)	14 gün
	Zeytin kabuklubiti (<i>Parlatoria oleae</i>)		
Hıyar (Sera)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 ml/ 100 L su (Larva, pupa)	14 gün
Kornişon (Sera)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 ml/ 100 L su (Larva, pupa)	14 gün
Kabak (Sera)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 ml/ 100 L su (Larva)	1 gün
Gül	Gül koşnili (<i>Parthenolecanium spp</i>)	50 ml/ 100 L su (Larva)	14 gün
Nar	Nar beyazsineği (<i>Siphoninus phillyreae</i>)	50 ml/ 100 L su (Larva)	3 gün
İncir	Kanlibalsıra (<i>Ceroplastes rusci</i>)	50 ml/ 100 L su (Larva)	14 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesini deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

09 Mayıs 2024
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARLI İZMİR

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL TARWAX 10 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUBU	7C	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
-------	----	--------------------------

100 g/L Pyriproxifen

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması esnasında
- Hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara içmeyiniz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının ¼ üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Dikkatsizce kullanılır veya kısmen yutulursa kaslarda gerilme, refleks azalması ve hareketlerde dengesizlik görülür.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluması halinde: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

Yutma halinde: Herhangi bir sıvı vermeyiniz. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Tıbbi bakım alın.

Cilt teması halinde: Cildi bol sabun ve su ile yıkayın.

Göz teması halinde: Hemen gözü açık halde tutarak bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak üzere en az 15-20 dakika boyunca iyice yıkayınız. Eğer varsa kontak lensleri çıkarınız. Yıkama işlemi 5 dakika sonra tekrarlayınız. Göz yanması devam ederse, bir uzmana başvurunuz. Ağız yoluyla alma herhangi bir sıvı vermeyiniz. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Tıbbi bakım alın.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



Dr. Nesrin ÇAKIRARICAN
Daire Başkanı

Net Miktarı:

Azami perakende satış fiyatı:

Ek-1

İÇİNDEKİLER:

Pyriproxifen, Ksilen

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H302 + H312 + H332: Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P210: Isıdan/ kıvılcımdan/ alevden/ sıcak yüzeylerden uzak tutun.- Sigara içilmez.

P260: Tozunu/ dumanını/ gazını/ sisini/ buharını/ spreyini solumayın.

P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P403+ P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.

P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayınız.
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Bitki koruma ürününü ve artıkların havuz, akarsu ve gölleri bulaştırmayınız. Rüzgarla sürüklenmenin olabileceği havalarda kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Ateş ve kıvılcımdan uzak tutunuz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Tarım Kredi Kooperatifleri Şirketi
Tuzlukçu, Tuzlukçu Cd. No:287 S/Emel Sokak, 4083
Tuzlukçu, 23109 09 09 Pbx. Fax: 0 320 231 09 09
Tuzlukçu, 821030 1047 İletişim: 0 324 231 09 09
Tuzlukçu, 821030 1047 İletişim: 0 324 231 09 09

Barış SÜREL

Ziraat Yüksek Mühendisi

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesini deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Uygulama sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde yapılmalıdır her türlü alet ile püskürtülebilir.

Domates (Sera), Patlıcan, Hıyar (Sera), Kornişon (Sera), Kabak (Sera) ve Biber (Sera) Tütün beyazsineği: Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan seraya köşegenler yönünde girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva + pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Şeftali dut kabuklu biti: Uygulamalar birinci ve ikinci döllere karşı uygulanır. İlk larva çıkışından ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı çeşitlerin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Zeytin karakoşnili: Uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Bu amaçla uyulama yapılacak bahçelerde, bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın 4 yönünden 20-25 cm uzunluğundaki sürgünler üzerinde bulunan, o yıla ait yumurtalı dişiler kontrol edilerek, yumurtadan aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtaların %50'sinin açıldığı devrede birinci; %90'nın açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.

Zeytin kabuklubiti: Zararlıların 1. dölüne karşı çok yüksek popülasyonlar dışında uygulama yapılmamalıdır. Zararlıların ikinci dölünde ise bahçedeki zararlı yoğunluğu ve parazitlenme alanı göz önüne alınmalıdır. Uygulama, yumurtaların %50'sinin açıldığı ve birinci dönem larvaların çoğunlukta olduğu zaman yaprak ve meyvelerin tamamının ıslanabileceği şekilde yapılır. Bir uygulama yeterlidir.

Pamukta tütün beyazsineği: Beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva + pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

Nar beyazsineğine karşı yumurta, larva ve pupa sayılarının toplamı yaprak başına 10 ve üzeri ise uygulamaya karar verilir.

Gülde koşnile karşı ilkbaharda koşnilin beslenerek kabarmaya başlamasından itibaren henüz yumurtlama dönemine girmeden önce (nisan ortası ve mayısın ilk haftası) veya koşnilin yumurta açılımının en yüksek olduğu dönemde, birinci dönem larvalara uygulama yapılmalıdır.

İncirde kanlıbalsıra'ya karşı bulaşık emzik adedi %5'i geçtiği zaman, koşnilin %90'dan fazlası açıldığında uygulama yapılır. İlekleme tarihinden 1 hafta öncesi ve ilekleme takip eden 10 günlük süre içerisinde uygulama yapılmaz. Tek uygulama yeterlidir. Uygulama tercihen hasat sonu ekim ayı ortasında yapılmalıdır.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

EFDAL TARWAX 10 EC isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu 7C olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **EFDAL TARWAX 10 EC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 7C harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL TARWAX 10 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUBU	7C	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
		100 g/L Pyriproxifen

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulayınız.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçı Ek-1'uma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar'uma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uyma...likler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.


RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:287 MANİSA
Tel: 0 236 234 09 09 pbx.
Çağrı Merkez: 444 31 50
Faks: 0 236 237 96 45
www.tarkimbk.com.tr

TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Turgut Özal Mahallesi Turgutlu C. No:287 Şişli/Edirne/Manisa
Tel: 0 236 234 09 09 Pb. Fax: 0 236 237 96 45
E-posta: info@tarkimbk.com.tr
Tic. Sic. No: 12112
Tic. Sic. No: 1821 0301 0670 0012 www.tarkimbk.com.tr

Barış SÜREL
Ziraat Yüksek Mühendisi



Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

09 Mayıs 2024
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
CİDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KADIKÖY/İSTANBUL