

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarihi ve No: 29.09.2011 / 8413

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Elma	Akdiken akarı (<i>Tetranychus viennensis</i>)	30 g/100 L su	7 gün
Elma	Avrupa kırmızıdümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	37.5 g/100 L su	7 gün
Armut	Armut psillidi (<i>Cocopsylla pyri</i>)	100 g/100 L su	7 gün
Pasulye	Kırmızıdümcek (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	75 g/100 L su	7 gün
Pamuk	Kırmızıdümcek (<i>Tetranychus spp.</i>)	60 g/da	7 gün
Bağ*	İki noktalı kırmızıdümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 g/100 L su	7 gün
Çilek	Kırmızıdümcek (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	60 g/100 L su	7 gün
Gül	Kırmızıdümcek (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	60 g/100 L su	7 gün
Karanfil	Kırmızıdümcek (<i>Tetranychus spp.</i>)	60 g/100 L su	7 gün
Domates	Kırmızıdümcek (<i>Tetranychus spp.</i>)	75 gr /da	3 gün

*Tüketim amaçlı bağ hasadı yapılan bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tıkanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde Uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLÜĞÜ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra Uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL TEBUSAI 20 WP

Suda Islanabilen Toz [WP]

GRUBU	21-A	İNSEKTİSİT - AKARİSİT (Böcek - Kırmızıdümcek ilacı)
-------	------	--

%20 Tebufenpyrad

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan ve gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Bitki koruma ürününün esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara içmeyiniz.
- Bitki koruma uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

ILKYARDIM BELİRTİLERİ:

Solunması halinde: Solunduğu takdirde temiz havaya çıkartınız. Soluma, yutma ya da temas halinde tıbbi yardım alınız ve mümkünse yanınızda ilacın etiketini ya da güvenlik bilgi formunu bulundurunuz.

Yutulması halinde: Herhangi bir sıvı vermeyiniz. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Tıbbi bakım alınız.

Cilt ile teması halinde: Cildi hemen en az 15 dakika süreyle bol su ile yıkayın. Ürünü bulaştığı giysi ve ayakkabıları hemen çıkarın. Belirtiler artarsa tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dâhil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Bir uzmana başvurunuz.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Türkiye Tarım İleri Kooperatifleri İştirakidir.



26 Ekim 2021

**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.**

Net Miktarı:
Azami Per. Satış Fiyatı:
İçindekiler:
Tebufenpyrad

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

ÖNLEM İFADELERİ:

P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P264: Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P301 + P312: YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P330: Ağızınızı çalkalayın.

P501: İçeriği/kabı 'Atık Yönetimi Yönetmeliği' uyarınca bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Ürünü, orijinal ambalajı içinde, ağız sıkıca kapalı olarak, gıdalardan uzakta, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde, kilit altında muhafaza ediniz.

Sedef YÜCEL TEKOĞLU
Yüksek Yetkili Yetkili
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Temas ve mide yoluyla etkili, aynı zamanda translaminar özelliğe sahip bir akarisitir. Kırmızıörümceklerin larva, nimf ve erginlerini kontrol eder.

Elma- Akdiken akarı ve Avrupa kırmızıörümceği: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Armut-Armut psilidi: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15 den fazlasında buluşma görüldüğünde ilaçlama yapılır. Her sürgünde bir birey görüldüğü zaman o sürgün bulaşık kabul edilir.

Fasulye- Pamuk kırmızıörümceği: Fasulyede yaprak başına ortalama 3-5 adet canlı Kırmızı örümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Bağ- İki noktalı kırmızıörümceği: Yaprak başına 5-8 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Çilek – Pamuk kırmızıörümceği:

Erken dönem uygulaması: Kırmızı örümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında çilek yeşil meyve döneminde (İlk olgun meyveler görülmeden önce), Kırmızı örümcekler görüldüğünde bir uygulama yapılmalıdır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha güvenlidir.

Mevsim İci uygulama: Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, açıkta yetiştirilen çilekler mevsim başında (Mart sonu- Nisan başı)3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve uygulanması yeterlidir. Popülasyonun yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yapraklık incelenir. Yapraklık başına 15 ve üzerinde Kırmızı örümcek tespit edilmesi halinde uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkate edilerek hasat yapılmalıdır.

Pamuk- Kırmızıörümcekler: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklı iken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlara uygulanmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesi'nde 5 adet, Ege ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde 10 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Domates- Kırmızıörümcekler: Domateste yaprak başına ortalama 3-5 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Gül- Karanfil Kırmızıörümcekler: Sus bitkisi ekim alanları sık sık kontrol edilerek özellikle yaprakların altında Kırmızı örümcek aranır. Lokal bulaşma tespit edildiğinde ilaçlı mücadele sadece buralarda, sera veya açık alanlarda genelde yaygın bir bulaşmaya rastlandığında tamamı ilaçlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL TEBUSAI 20 WP isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu 21-A olarak sınıflandırılmış bir insektisit - akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL TEBUSAI 20 WP'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 21-A hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.

**EFDAL TEBUSAI 20 WP**

Suda Islanabilen Toz (WP)

GRUBU	21-A	İNSEKTİSİT - AKARİSİT (Böcek - Kırmızıörümcek İlacı)
-------	------	---

%20 Tebufenpyrad

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştirakidir.

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydıyla, imalatçı ilaçlarının kalitesini garanti eder. İmalatçı ilacın uygun olmayan koşullarda depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiye dışı kullanımdan doğabilecek zararlardan sorumludur.

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA:

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:287 MANİSA
Tel: 0 236 2340909 pbx. Faks: 0 236 2379645

www.tarkimbk.com.tr

Sefer YÜCEL TEKÖĞLU
Türkiye Kimyager
TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

26 Ekim 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

