

İmal tarihi:
Son kullanma tarihi:
Şarj numarası
Ruhsat tarihi ve numarası: 29.12.2011 / 8538

KULLANILACAK İTİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates	Kurşuni küf (Botrytis cinerea)	100 ml/100 L su	7 gün
Bağ*	Kurşuni küf (Botrytis cinerea)	100 ml/100 L su	7 gün
Çilek	Kurşuni küf (Botrytis cinerea)	100 ml/100 L su	3 gün
Biber	Kurşuni küf (Botrytis cinerea)	100 ml/100 L su	1 gün
Patlıcan	Kurşuni küf (Botrytis cinerea)	100 ml/100 L su	3 gün
(Sera)	Kurşuni küf (Botrytis cinerea)	100 ml/100 L su	3 gün
Hıyar	Kurşuni küf (Botrytis cinerea)	100 ml/100 L su	3 gün
(Sera)	Kurşuni küf (Botrytis cinerea)	100 ml/100 L su	3 gün
Kornişon	Kurşuni küf (Botrytis cinerea)	100 ml/100 L su	3 gün
(Sera)	Kurşuni küf (Botrytis cinerea)	100 ml/100 L su	3 gün

(* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışımı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

ILAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates, hıyar, kornişon biber ve patlıcanda kurşuni küf: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine göre 10 gün ara ile ilaçlamaya devam edilir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KURUMSAL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bakanlık Sayısı: 01 Şubat 2022

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL FENDOOR SC 500

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	17, G3	FUNGİSİT (Mantar İlaç)
-------	--------	---------------------------

500 g/L Fenhexamid

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan ve gıda ve hayvan yemlerinde uzak tutunuz.
- Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız
- Bitki koruma ürününün esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara içmeyiniz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 2 saat insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ½'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulamaya tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHRİLENME BELİRTİLERİ: Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Solunum: Solunduğu takdirde temiz havaya çıkartınız. Solunma, yutma ya da temas halinde tıbbi yardım alınız ve mümkünse yanınızda ilacın etiketini ya da güvenlik bilgi formunu bulundurunuz.

Yutma: Kusturmayınız. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Ağrı çalkalayınız.

Cilt teması: Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır, eğer varsa polietilen glikol 400'le ve arkasından bol suyla yıkanmalıdır.

Göz teması: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dâhil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Bir uzmana başvurunuz.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Bilinen bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHRİ DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İçim kredi Kooperatifleri Şiçketidir.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICI
Date: 06/12/2022

Net Miktarı:

Azami per. Satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

Fenhexamid

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

P391: Döküntüleri toplayınız.

P405: Kilit altında saklayınız.

P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf ediniz.

EU4001: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız. Çiçekte çiçeklenme zamanı kullanılabılır.
- Boş ilaç ambalajlarını başka gaye için kullanmayıp imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

**TARKİM BITKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Turquie Ovalik, Turquie, C. No: 247, S. No: 101, MANİSA
Tel: 0 236 231 00 00 Pbx. Fax: 0 236 237 46 45
Maksat V.D. 82 14 03 01 0067 Tc. Sic. No: 12112
Maksat Web: 0821 410 1012 www.tarkim.com.tr

Barış SUREL

Ziraat Yüksek Mühendisi

Bağda kursunu küf: Üzümler olgunlaşmaya başladığında doğruca salkımlara yönelik ilaçlamalar yapılır.

Çilek: Çiçeklenme döneminde kullanılabilir.

1. İlaçlama; çiçeklerin %10'u açtığında,

2. İlaçlama; çiçeklerin %50'si açtığında,

3. İlaçlama; yeşil meyve döneminde yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

EFDAL FENDOOR SC 500 isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu 17, G3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **EFDAL FENDOOR SC 500**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 17, G3 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL FENDOOR SC 500

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	17, G3	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
	500 g/L Fenhexamid	

ULUSAL ZEHIR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114



Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FIRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No: 287 MANİSA

Tel: 0 236 234 09 09 pbx.

Faks: 0 236 237 96 45

www.tarkimbk.com.tr

**TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Turgut Özal Mah. Turgutlu Cad. No:287 Sahranöket MANİSA

Tel: 0 236 234 09 09 pbx. Fax: 0 236 237 96 45

Mersis Y.D. 321800 1007 Tic. Sic. No: 12122

Merkis No: 0424 0001 0012 www.tarkimbk.com.tr

Barış SÜREL

Ziraat Yüksek Mühendisi

TARIM VE KÖY İŞLERİ
GIDA VE KURUMSAL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

01 Şubat 2022

