

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat tarihi ve no. su: 25.11.2020 / 11740

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama İle Hasat Arası Süre
Domates (Tarla)	Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü (<i>Fusarium</i> spp., <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.)	250 ml / 100 L su (10 ml/m ² 4 L su)	28 gün
Biber (Tarla)	Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü (<i>Fusarium</i> spp., <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.)	250 ml / 100 L su (10 ml/m ² 4 L su)	28 gün
Muz	Muz <i>Fusarium</i> solgunluğu (<i>Fusarium oxysporium</i> f. sp. <i>cabense</i>)	1000 ml/da	21 gün
Yerfıstığı	Yerfıstığında Kök boğazı çürüklüğü (<i>Aspergillus niger</i>)	400 ml / 100 kg tohuma	—
Tütün	Tütün Fidelerinde Çökerten (<i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Pythium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp.)	7,5 ml/m ² 3 L su ile	21 gün
Pamuk	Pamukta Fide Kök Çürüklüğü (<i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Fusarium</i> spp., <i>Alternaria</i> spp., <i>Macrophomina</i> spp., <i>Verticillium</i> spp., <i>Aspergillus niger</i>)	300 ml/ 100 kg havsız tohuma 500 ml/ 100 kg havlı tohuma	—
Mısır	Mısırdaki Tohum ve kök çürüklüğü, Fide Yanıklığı hastalıkları (<i>Pythium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.)	100 ml / 100 kg tohum	—
Biber (sera)	Biberde Fide Kök Çürüklüğü (<i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Fusarium</i> spp.)	500 ml/da Damlama sulama ile	28 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

Damlama sulama için: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Tankın deposu yarıya kadar su ile doldurulur, hazırlanan karışım tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek tank hesaplanan su miktarına tamamlanır.

Tohum uygulaması için: Tohum uygulama işlemi döner uygulama bidonu veya tohuma püskürtme prensibi ile çalışan tohum uygulama makinesi ile yapılabilir. Uygun ekipman bulunmaması durumunda, tohumlar düz bir zemin üzerine yayılarak homojen bir kaplama sağlanacak şekilde uygulama yapılır. İlaçlanmış tohum evvelce yapılmış mibzer ayarını değiştirebileceğinden ekimden önce ilaçlı tohum ile mibzer ayarının tekrar yapılması tavsiye edilir. Kullandıktan sonra uygulama aletinin içiye temizlenmesi gerekir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

15 Mart 2024

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL TAXİM

Tohum İlaçlaması İçin Akıcı Konsantre (FS)

GRUP	E2,12	A1,4	Fungisit (Mantar ilacı)
------	-------	------	-------------------------

25 g/l Fludioxonil + 10 g/l Metalaxyl-M

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış tohumluğu insan ve hayvan yemi olarak kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak içiye çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Solunması halinde: Kişiyi temiz havaya çıkartın ve rahat nefes almasını sağlayın.

Deriyle temas etmesi halinde: Cildi bol su ile yıkayın. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın. Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

Göze temas etmesi halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

Yutulması halinde: Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Net Miktarı:
Azami per. Satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:
Fludioxonil, Metalaxyl-M

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ: (H)

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319: Solunması halinde zararlıdır.

H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ: (P)

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçınınız.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).

P501: İçeriği/kabı 'Atık Yönetimi Yönetmeliği' uyarınca bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılar için zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak muhafaza ediniz, başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Kalan ürün mahlulünü kuyu, havuz, çeşme yalakları ve akarsulara dökmeyiniz.

**TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Genel Müdürlüğü
Tic. Sic. No: 231 09 09 9196 / Tic. Sic. No: 237 96 45
Tic. Sic. No: 231 03 01 0677 / Tic. Sic. No: 12132
Tic. Sic. No: 231 03 01 0670 0012 www.tarkimbk.com.tr

Barış SÜREL
Ziraat Yüksek Mühendisi

Devamı Arka Sayfada

Sayfa 1/2

Etiketin Devamı

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Damlama sisteminin kalibrasyonu: Damlama sisteminin kalibrasyonu için baştan ve sondan 3 meme 10 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma %10'u geçmemelidir. Dekara verilecek bitki koruma ürünü için gerekli su miktarı belirlenir.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemlerini su kaynaklarının yanında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates (tarla), Biber (tarla) Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü: Toprak uygulaması, ekimden önce veya ekimle birlikte yapılır. Fide ilaçlaması, fideler toprak yüzüne çıktıktan sonra bir veya birden fazla uygulama olabilir. Uygulamada süzgeçli kova kullanılabilir ve m²'ye 4 litre su ile biber ve domatesten 10 ml bitki koruma ürünü kullanılır. 1.uygulamadan 14 gün sonra ikinci uygulama gerçekleştirilir.

Muzda Muz fusarium solgunluğu: Fusarium solgunluğu mücadelesinde fidelerin dikim sırasında ürün dekara 1000 ml gelecek şekilde can suyu ile birlikte verilir.

Yerfıstığı kökboğazı çürüklüğü: Tohum uygulamasıdır. Bitki koruma ürününün tohum yüzeyinde tutunabilmesi için tohumlar önceden nemlendirilir.

Tütün fidelerinde çökerten: Fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılır. Fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılacak uygulamalar 8-10 gün aralıklarla yinelenir. Hastalık görülür görülmez yapılacak uygulamalar, şaşırtma devresine kadar haftada bir uygulanır.

Pamuk fide kök çürüklüğü: Tohum tarlaya ekilmeden önce uygulanır. Uygulama zamanı ekim zamanıdır. İslatılmış pamuk tohumları önerilen doz ve miktarda bitki koruma ürünü uygulama bidonuna veya selektöre konulur. Uygulama bidonu yeknesak bir uygulama yapıcaya kadar 40-50 defa çevrilir. Selektörde ise uygulama tertibatının ayarlanması ile yapılır.

Mısırdan tohum ve kökçürüklüğü, fide yanıklığı hastalıkları: Ekimden önce tohumlar ilaçlanır ve uygulamadan sonra kısa zamanda ekilmelidir.

Biber (sera) Biberde Fide Kök Çürüklüğü: Toprak uygulaması ekimden önce veya ekimle birlikte yapılır. Fide ilaçlaması, fideler toprak yüzüne çıktıktan sonra bir veya birden fazla uygulama olabilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL TAXİM isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu **E2,12; A1,4** olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **EFDAL TAXİM'** in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup **E2,12; A1,4** harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösterin.

KARŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması önerilmez

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL TAXİM

Tohum İlaçlaması İçin Akıcı Konsatre (FS)

GRUP	E2,12	A1,4	Fungisit (Mantar İlacı)
------	-------	------	-------------------------

25 g/l Fludioxonil + 10 g/l Metalaxyl-M

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Belirli bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında **4 yıl** süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI: Orijinal ambalajında satılmak kaydıyla, imalatçı ürünlerinin kalitesini garanti eder. İmalatçı ürünün uygun olmayan koşullarda depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiye dışı kullanımdan doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:287 MANİSA
Tel: 0 236 2340909 pbx.
Çağrı Merkez:4443150
Faks: 0 236 2379645
www.tarkimbk.com.tr

**TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
Turgut Özal Mahallesi Turgutlu C. No:287 Şişli/Manisa
Tic. Sic. No: 231199/00100 Faks: 0 236 237 96 45
Tic. Sic. No: 231030/1067 Tic. Sic. No: 12192
Tic. Sic. No: 0824 0301 de 24 0012 www.tarkimbk.com.tr
Baş SÜREL
Ziraat Yüksek Mühendisi

**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
KABUL EDİLMİŞTİR

15 Mart 2024

