

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat tarihi ve no. su: 11.03.2019 / 11333

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (Sera)	Patlıcangillerde külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	100 ml/100 L su	3 gün
Domates (Tarla)	Erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	60 ml / da	3 gün
Bağ*	Bağ mildiyözü (<i>Plasmopara viticola</i>)	80 ml/100 L su	21 gün
	Bağ küllemesi (<i>Erysiphe necator</i>)	80 ml/100 L su	
	Bağda ölükol (<i>Phomopsis viticola</i>)	80 ml/100 L su	
Antepfıstığı	Antepfıstığında Karazenk (<i>Pseudocercospora pistacina</i>)	100 ml/100 L su	21 gün
Hıyar (Sera)	Kabakgillerde Külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	80 ml/ 100 L su	3 gün
Hıyar (Tarla)	Kabakgillerde külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	75 ml / da	3 gün
Kornişon (Sera)	Kabakgillerde Külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	80 ml/ 100 L su	3 gün
Kornişon (Tarla)	Kabakgillerde külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	75 ml / da	3 gün
Biber (Sera)	Patlıcangillerde külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	100 ml / 100 l su	3 gün
Nar	Kahverengi leke (<i>Alternaria alternata</i>)	80 ml/ 100 L su	21 gün
Karpuz	Kabakgillerde külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	75 ml / da	3 gün
Kavun	Alternarya yaprak yanıklığı (<i>Alternaria cucurbitina</i>)	80 ml / 100 L su	3 gün

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



tarkim

EFDAL AZİBUT

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	C3:11	G1:3	FUNGİSİT (MANTAR İLACI)
------	-------	------	-------------------------

200 g/l Azoxystrobin + 125 g/l Difenconazole

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Genel ilkyardım müdahaleleri: Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın.

Solunması halinde: Kişiyi temiz havaya çıkartın ve rahat nefes almasını sağlayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru / hekimi arayın.

Deriyle temas etmesi halinde: Cildi bol su ile yıkayın.

Gözle temas etmesi halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

Yutulması halinde: Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri Şirkettir.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
28 Şubat 2025

Net Miktarı:

Azami per. Satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Azoxystrobin, Difenconazole

Ek-1

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ: (H)

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ: (P)

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P261: Tozunu/ dumanını/ gazını/ sisini/ buharını/ spreyini solumaktan kaçının.

P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P280: Korumacı eldiven/korumacı kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılar için zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak muhafaza ediniz, başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Kalan ürün mahlulünü kuyu, havuz, çeşme yalakları ve akarsulara dökmeyiniz.

DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Yenişehir, Turgutlu Cad. No:257 Şehzadeler-ANİŞA
Tic. Sic. No: 236 034 09 09 Pbx Fax: 0 236 237 96 45
Tic. Sic. No: 236 034 030 1967 Tic. Sic. No: 12122
Tic. Sic. No: 052 0301 0570 0012 www.tarkimbk.com.tr

Barış SÜREL

Ziraat Yüksek Mühendisi

Bağda ölükol:

Dormant dönem ilaçlaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan (tomurcuk patlamasından) 3-4 hafta önce dormant dönem uygulaması yapılır.

Yeşil aksam ilaçlaması: Vejetasyon döneminde aşağıdaki programa göre yapılır.

1. ilaçlama: Gözlerin uyanma (Tomurcuk patlaması) başlangıcında,
2. ilaçlama: Sürgünler 8-10 cm uzunluğa ulaştığı dönemde,
3. ilaçlama: Çiçeklenme döneminden hemen önce (çiçek salkımlarının belirlediği dönemde),
4. ilaçlama: Çiçeklenme sonu-tane seti oluşumu başlangıcında yapılmalıdır.

Antepfıstığında Karazenk:

1. uygulama: Koruyucu fungusitlerle mücadele yapılacaksa, uygulamaların mutlaka ilk enfeksiyonlardan önce, yaprakların açılmaya başladığı dönemde; tedavi edici fungusitlerle mücadele yapılacaksa meyveler nohut tanesi iriliğinde ve yapraklar tam olarak açtığı dönemde yapılmalıdır. Ayrıca, tedavi edici fungusitlerle ilk belirtilerin görüldüğü döneme kadar uygulama yapılabilir.

2. uygulama ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece 15 gün aralıklarla devam edilmelidir. Uygulamaların yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır.

Nar - Kahverengileke:

1. uygulama: Çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığında yapılır.
2. uygulama: Taç yaprakları döküldüğünde yapılır.
3. uygulama: Meyveler yarı büyüklüğüne geldiğinde yapılır.

Hıyar (sera, tarla), Kornişon (sera, tarla), Karpuz - Kabakgillerde Külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır, Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya 12-14 gün ara ile devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 °C'nin üstünde ve orantılı nemin de %50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamalara ara verilmelidir.

Domates (Tarla) ve Patateste Erken Yaprak Yanıklığı:

Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ürünün etki süresine bağlı olarak uygulama tekrarlanmalıdır.

Kavun - Alternaria Yaprak Yanıklığı : Uygulamalar yeşil aksam uygulaması şeklinde yapılır. Çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamalara başlanır, hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve uygulamanın etkinlik süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla devam edilir.

Ispanak yaprak leke hastalığı: Uygulama hastalık koşullarının oluşmaya başladığı ve enfeksiyon riskinin yükseldiği dönemde yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır. Diğer uygulamalara ise 10' ar gün ara ile 3 uygulama şeklinde yapılır.

Nohut antraknozu: İlaçlamaya günlük ortalama sıcaklığın 10 °C ve orantılı nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekirse de pratik olarak hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde uygulamalara devam edilir.

Fındık külleme: Erysiphe sp.'nin neden olduğu Külleme hastalığı bahçede ilk defa çıkıyorsa, belirtiler görülür görülmez ilaçlamaya başlanmalıdır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise, meyve (çotanak) bağlama döneminde ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak 12 – 14 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL AZİBUT isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu **C3:11; G1:3** olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **EFDAL AZİBUT**'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup **C3:11; G1:3** harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösterin.

KARŞILIRLILIK DURUMU: Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL AZİBUT

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	C3:11	G1:3	FUNGİSİT (MANTAR İLACI)
------	-------	------	----------------------------

200 g/l Azoxyystrobin + 125 g/l Difenconazole

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Belirli bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FIRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:287 MANİSA
Tel: 0 236 2340909 pbx.
Faks: 0 236 2379645
www.tarkimbk.com.tr

**TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Cn. No: 287 Sehzadeler-MANİSA
Tel: 0 236 234 09 09 Pbx. Faks: 0 236 237 96 45
Tic. Sic. No: 23 030 1067 Tic. Sic. No: 12122
Tic. Sic. No: 1824 0001 0670 0012 www.tarkimbk.com.tr
Barış SÜREL
Ziraat Yüksek Mühendisi



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

KABUL EDİLMİŞTİR

28 Subat 2025

Sayfa: 3/3