



tarkim
TARKİM BİTKİ KORUMA A.Ş.

Efdal



240 SC

Flowmite

KARANFİL, DOMATES, HIYAR, ÇİLEK, BİBER, PATLICAN, BAĞ

Aktif Madde ve Miktarı Bifenazate 240g/l

Grubu 25

AKARİSİT (Kırmızı örümcek ilacı)
Kontak Etkili

Kırmızı
Örümcek de
güvenli
çözüm



Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri Şirkettir.



444 31 50

Çağrı Merkezi

www.tarkimbk.com.tr

ETKİ ŞEKLİ

“Bifenazate” aktif maddesi Kırmızıörümceklerin sinir sistemini bozarak hiperaktiviteye (sürekli hızlı hareketlilik) neden olur. Temas yolu ile etkili olup beslenmeleri kısa bir sürede durur. Ölümler 3-4 ‘ncü günde görülmeye başlanır.

KULLANIM ŞEKLİ

İlaçlamadan başarılı bir sonuç alınabilmesi için tüm bitkilerin bütün organlarını ve yaprakların her iki yüzünü de kaplayacak şekilde uygulama yapılması şarttır. İlaçlama rüzgarsız bir havada sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam üzeri yapılmalıdır. Atomizör yaprakları alabora edip tek yüzünü ilaçladığından, sırt pülverizatörü veya yaprak altı memeleri de bulunan ilaçlama aletleri tercih edilmelidir.

ÖZELLİKLERİ

Flowmite kırmızıörümceklerin kontrolünde kullanılan seçici bir akarisitir. **Flowmite** Bağ, Domates, Hıyar, Biber, Patlıcan, Çilek, Karanfil kırmızı örümceklerin yumurta dahil tüm hareketli dönemlerine karşı etkilidir. **Flowmite** Ani ve uzun süreli kalıcı bir etki sağlar. **Flowmite** Emülsiyon konsantre formülasyonlu bir ilaçtır. **Flowmite** Ürünün uygulanmasından 6 saat sonra yağın yağmur ürünün etkisini azaltmaz.

Hazırlanan ilaç hemen kullanılmalıdır.

Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla ilaçlı mahlül hazırlamayınız.

KULLANIM DÖNEMİ

Bağ-İki Noktalı Kırmızıörümcek: Bağ alanlarındaki iki noktalı Kırmızıörümceklere karşı mücadele zararının yayılış gösterdiği alanlar gözlem altında tutulmalı, popülasyon yoğunluğu yaprak başına ortalama 8 hareketli bireyi geçtiğinde bir ilaçlama yapılmalıdır. Zararlı popülasyon yoğunluğu eşeğin üzerinde devam ettiği takdirde son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süre dikkate alınarak ilacın etki süresi bittiğinde veya hasattan sonra ikinci bir ilaçlama yapılmalıdır.

Biber (sera)-Pamuk Kırmızıörümceği: Yaprak başına ortalama 3 adet canlı birey bulunduğunda mücadeleye karar verilir.

Çilek-İki Noktalı Kırmızıörümcek, Pamuk Kırmızıörümceği: Bitkilerin alt ve orta bölümlerinden alınan en az 50 yaprakçıkta yaprakçık başına hareketli dönemde ortalama 15 ve üzerinde Kırmızıörümcek

olması durumunda ilaçlama yapılır.


Domates (Tarla-sera)-İki Noktalı Kırmızıörümcek, Pamuk kırmızıörümceği: Yaprak başına ortalama 5 adet canlı Kırmızıörümcek bulunduğu mücadelede karar verilir.

Hıyar (sera)-İki Noktalı Kırmızıörümcek, Pamuk Kırmızıörümceği: Yaprak başına ortalama 5 adet canlı Kırmızıörümcek bulunduğu mücadelede karar verilir.

Karanfil-Pamuk Kırmızıörümceği: İlaç bitki çiçeklenmeden önce veya çiçek kesiminden sonra uygulanmalıdır. Bir yaprakta ortalama 10 adet Kırmızıörümcek bulunduğu ilaçlama yapılır. Tek uygulama yeterlidir.

Patlıcan (Sera)-İki Noktalı Kırmızıörümcek, Pamuk Kırmızıörümceği: Yaprak başına ortalama 5 adet canlı Kırmızıörümcek bulunduğu mücadelede karar verilir.

KIRMIZI ÖRÜMCEK YAŞAM EVRELERİ



Pamuk kırmızıörümceği (*Tetranychus cinnabarinus*)



İki noktalı kırmızıörümcek (*Tetranychus urticae*)

DİRENÇ YÖNETİMİ

Bir üretim sezonu boyunca en fazla bir kez popülasyonun yüksek olduğu durumlarda ise yedi gün ara ile iki kez kullanılmalıdır.

Bir sezonda kırmızı örümcek ile mücadelede 2’den fazla uygulama gerekiyor ise diğer uygulamalar için başka etki mekanizmasına sahip akarisitler ile dönüşümlü olarak kullanılmalıdır.

Antirezistans (Bağışıklık önleyici) programlarında rahatlıkla uygulanabilir.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ADI	KULLANIM DOZU VE DÖNEMİ	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
BAĞ*	İki Noktalı Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	60 ml / 100 L su (yumurta, larva, nimf, ergin)	14 Gün
BİBER (SERA)	İki Noktalı Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>) Pamuk Kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	60 ml/100 L su (yumurta, larva, nimf, ergin)	
ÇİLEK	İki Noktalı Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>) Pamuk Kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	60 ml/100 L su (larva, nimf, ergin)	
DOMATES (TARLA-SERA)	İki Noktalı Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>) Pamuk Kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	60ml/da (larva, nimf, ergin)	1 Gün
HIYAR (SERA)	İki Noktalı Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>) Pamuk Kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	60 ml/100 L su (larva, nimf, ergin)	
KARANFİL	Pamuk Kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	60ml/da	
PATLICAN (SERA)	İki Noktalı Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>) Pamuk Kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	60 ml/100 L su (yumurta, larva, nimf, ergin)	

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

%74 Bordo bulamacı, %80 Kükürt WG ve Yazlık yağ gibi formülasyonlu bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz. Diğer ilaçlar ile karıştırmadan önce bir ön karışım hazırlayarak karışımın uygunluğunun kontrol edilmesi tavsiye edilir.