

Efdal Gart 600

DOMATES, BAĞ, TÜTÜN, MARUL, HIYAR, PATATES

Aktif Madde ve Miktarı	Fosforoz Asit 600 g/L
Grubu	U:33

FUNGUSİT (Mantar İlacı)
Sistemik etkili.

Hastalıklara
Karşı
Gart'ını al



Efdal Gart 600

İLACI KULLANIRKEN

Kullanma dozu ve dönemine göre tavsiye edilen dozlara mutlaka uyunuz.

ETKİ ŞEKLİ

- “Fosforoz asit”: Koruyucu ve tedavi edici özelliğindedir.
- Yeşil aksam ve topraktan uygulanabilir. Hem yapraktan kök- lere doğru, yukarıdan aşağıya, hem de aşağıdan yukarı doğru sistemik olarak taşınabilir.

ÖZELLİKLERİ

- **Gart 600** Suda çözünen konsantre (SL) formülasyonludur.
- **Gart 600** Mildiyö hastalığını kontrol eder.
- **Gart 600** Uzun süre etkilidir.
- Kullanmadan önce ilaç şişesini iyice çalkalayınız.
- Ph'si 7 civarında olan temiz su kullanılması tavsiye edilir.

İnsan ve Çevre sağlığı için son derece GÜVENLİDİR.

Yararlı organizmalara ZARARSIZDIR.

BEKLEME SÜRESİ SIFIR GÜNDÜR.



Domates (Tarla-sera) Mildiyö
(Phytophthora infestans)



Tütün Mildiyö
(Peronospora tabacina)



Bağ Mildiyö
(Plasmopara viticola)



Marul Mildiyö (Bremia lactucae)



Hıyar (Sera) Kabakgillerde Mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis)



Patates Mildiyö
(Phytophthora infestans)

KULLANIM ŞEKLİ

Domateste Mildiyö: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında, kah-verengi lekelerin alt yüzünde beyaz küllü konidi örtüsünün görülmesiyle başlanır. Bitkinin yaprak alt yüzlerinin ve her tarafa iyice uygulanması gerekir. Uygulamalar 7-10 gün ara ile hastalığın şiddetine ve iklim koşullarına göre 3 ile 8 kez uygulanmalıdır.

Bağ Mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. bitki koruma ürünü süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

Tütün Mildiyö: Fidelelikte tohumlar çimlenip fidelerin toprak yüzeyini örtmesinden sonra, tarlada ise dikim işi bittikten sonra uygulamalara başlanmalı, 14 gün aralıklarla devam edilmelidir. Hastalık şiddetinin yüksek olduğu hallerde uygulama aralığının 10 güne indirilmesi tavsiye edilir.

Marul mildiyö: Fideleliklerde hastalık görülmeden koruyucu bir uygulama yapılmalıdır. Mildiyö görülürse hasta kısımlar toplanıp yok edildikten sonra birer hafta aralarla fidelerin şaşırtılmasına kadar uygulamalar sürdürülebilir. Şaşırtıldıktan sonra hastalığın çevrede görülmesiyle uygulamaya başlanmalı ve birer hafta aralarla devam edilmelidir. Uygulama, sulama yapıldıktan ve yapraklar kuruduktan sonra yapılmalıdır. Yaprakların alt ve üstlerinin ürün ile iyice kaplanmasına özen gösterilmelidir.

Hıyar kabakgillerde mildiyö: Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesiyle başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Patateste mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanır.

UYGULAMAYA HAZIRLAMA

Tavsiye dozu üzerinden bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır.

Uygulama makinesinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. İlaçlama, günün erken saatlerinde veya akşam serinliğinde bitkinin her tarafı iyice ıslanacak şekilde kaplama ilaçlama olarak ve rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.

Hazırlanan ilaç hemen kullanılmalıdır. Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla ilaçlı mahlül hazırlamayınız.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

BİTKİ ADI	HASTALIK ADI	KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (Tarla-sera)	Mildiyö (Phytophthora infestans)	300 g/100 L su	
Tütün	Mildiyö (Peronospora tabacina)	300 g/100 L su	
Bağ	Mildiyö (Plasmopara viticola)	300 g/100 L su	
Marul	Marul Mildiyö (Bremia lactucae)	275 ml/ 100 L su	
Hıyar (Sera)	Kabakgillerde Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)	275 ml/ 100 L su	
Patates	Mildiyö (Phytophthora infestans)	300 ml/da	

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilemez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.