

Efdal **Kip** 50WG  
ELMA, KAYISI

Aktif Madde ve Miktarı **Cyprodinil %50**  
Grubu **D1:9**

**FUNGUSİT** (Mantar İlacı)  
Sistemik Etkili

**Kısa  
sürede  
güvenilir  
çözüm**



## ETKİ ŞEKLİ

- "Cyprodinil" Sistemik bir fungisitir.
- Yapraklardan iyi ve hızlı bir şekilde bitki bünyesine alınır.
- İlaç bitkide aşağıdan yukarıya doğru ve yaprakların bir yüzünden diğer yüzüne taşınır.
- Hem bitki içinde hem de bitki yüzeyinde penetrasyonu ve miselyal gelişmeyi engeller.
- Spor çimlenmesinde sonra harekete geçer, fungusun girişini ve yaprak yüzeyi ile bitki dokularında hastalık gelişimini engeller.
- Hidrolik enzim salgılamayı ve metionin biyosentezini engeller.

## ÖZELLİKLERİ

- "Kip" Koruyucu ilaçlamalar şeklinde uygulanmalıdır.
- "Kip" Suda dağılılabilen granül (WG) formülasyonu sayesinde suda maximum düzeyde erir ve ilaç hazırlanırken kesinlikle tozamaz.
- "Kip" Lekesiz ve kaliteli ürün elde etmenizi sağlar.
- "Kip" Güçlü sistemik etkisi en az iki farklı açıdan hastalıklarla savaşır, patojenlerin yaprak-  
tan girişini ve dokularında gelişimini engeller. Bu çift etki mekanizması güçlü bir hastalık kontrolü sağlar.
- "Kip" Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında, tavsiye edilen kültür bitkileri üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.
- Ph'si 7 civarında olan temiz su kullanılması tavsiye edilir.

## KULLANMA ŞEKLİ ve ZAMANI

### Elma Kara Lekesi:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (Dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüğünde
4. ve Diğer uygulamalar: iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

### Kayısıda Sert Çekirdekli Meyvelerde Çiçek Monilyası (*Sclerotinia laxa*)

1. uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)
2. Uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100) yapılır.



Karaleke (*Venturia inaequalis*)



Karaleke (*Venturia inaequalis*)



Çiçek Monilyası (*Sclerotinia laxa*)



Çiçek Monilyası (*Sclerotinia laxa*)

Anlara bekleme süresi  
1 gündür

Entegre mücadele  
programları için uygundur.

## KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

| BİTKİ ADI | HASTALIK ADI                                                           | KULLANMA DOZU | Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| Elma      | Karaleke ( <i>Venturia inaequalis</i> )                                | 40 g/100 L su | 28 Gün                                 |
| Kayısı    | Sert Çekirdekli Meyvelerde Çiçek Monilyası ( <i>Sclerotinia laxa</i> ) | 30 g/100 L su | 7 Gün                                  |

## KARIŞABİLİRLİK DURUMU

"Kip" genellikle yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyve ağaçlarında kullanılan diğer fungusitler ile karışım halinde kullanılabilir. Şüphe halinde uygulamadan önce küçük bir karışılabilirlik testi yapılmalıdır. Şayet "Kip", başka bitki koruma ürünleri ile depo karışımı olarak kullanılacak ise ürünleri suya aşağıdaki sıraya göre koyunuz. Önce "Kip", sonra karışıma giren diğer bitki koruma ürünleri koyulur. Şayet karışım halinde kullanılacak bitki koruma ürünleri arasında 'suda eriyebilir ambalaj' da bulunanlar var ise önce bunlar, sonra "Kip" eklenmelidir.

### Kayısı Fenolojik Dönem




4 İlaçlama zamanı



5 İlaçlama zamanı

### Elma Fenolojik Dönem



4 İlaçlama zamanı



5 İlaçlama zamanı