

Devamını İsteğe Sırtada

Bitki Adı	Yabancıot Adı	Uygulama Dozu	Uygulama Dönemi
IMI toleranslı Clearfield ayçiçeği çeşitleri	Horoziböğü (Amaranthus albus) Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) Sirken (Chenopodium album) Darıcan (Echinochloa crus-galli) Canavar otu (Orobancha cernua) Çobandeğneği (Polygonum aviculare) Köpek üzümü (Solanum nigrum) Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)	125 ml/da	Ayçiçeğinin 4-8 gerçek yapraklı, yabancı otların 8-10 yapraklı döneminde, çıkış sonrası uygulanır
Bezelye	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) Çobançantası (Capsella bursa-pastoris) Sirken (Chenopodium album) Şeytan elması (Datura stramonium) Darıcan (Echinochloa crus-galli) Hakiki şahtere (Fumaria officinalis) Ballıbaba (Lamium amplexicaule) Çobandeğneği (Polygonum aviculare) Yapışkan ot (Setaria verticillata) Kuş otu (Stellaria media) Isırğan Otu (Urtica urens) Yavşan otu (Veronica spp.) Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)	100 ml/da	Erken çıkış sonrası uygulanır
Fasulye	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) Çobandeğneği (Polygonum aviculare) Sirken (Chenopodium album) Şeytan elması (Datura stramonium) Darıcan (Echinochloa crus-galli) Hakiki şahtere (Fumaria officinalis) Yapışkan ot (Setaria verticillata) Köpek üzümü (Solanum nigrum) Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)	100 ml/da	Erken çıkış sonrası uygulanır
Soya	Sütleğen (Euphorbia heterophylla, E.nufans) Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) Darıcan (Echinochloa crus-galli) Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium) Yapışkan otu (Setaria verticillata)	125 ml/da	Erken çıkış sonrası uygulanır


Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROLE DİLMİŞTİR

TAKİM BİTKİ KORUMA
SİLAHI VE TİCARET A.Ş.
TAKİM BİTKİ KORUMA GİR. Şİ. 292 5000001 MERSİS
0212 232 232 3015 T: 0212 232 3015
F: 0212 232 3015 Ş: 0212 232 3015
MERSİS: 0212 232 232 3015 www.takim.co.tr

Bağış SÜREL
Ziraat Yüksek Mühendisi

07:52 2024

Ek-2

Yerfıstığı	Hakiki Şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yapışkan otu (<i>Setaria verticillata</i>)	100 ml/da	Erken çıkış sonrası uygulanır
	Domuzpıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) Çoban değneği (<i>Polygonum aviculare</i>) Fener otu (<i>Physalis angulata</i>)	125 ml/da	Erken çıkış sonrası uygulanır
Yonca	Küsküt (<i>Cuscuta spp.</i>)	125 ml/da	Yoncanın 10-12 yapraklı döneminde uygulanır
ÇELTİK (İMİ toleranslı çeltik çeşitleri)	Çeltik (<i>Oryza sativa</i>)	125 ml/da	Yabancı otlar 1-4 yapraklı, Çeltik 1-3 yapraklı dönem
	Su biberi (<i>Polygonum hydropiper</i>)	150 ml/da	Yabancı otlar 1-4 yapraklı, Çeltik 2-3 yapraklı dönem
	Baraj otu (<i>Diplachne fusca</i>)	125 ml/da	Yabancı otlar 1-4 yapraklı, Çeltik 1-3 yapraklı dönem
	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	125 ml/da	Yabancı otlar 1-4 yapraklı, Çeltik 1-3 yapraklı dönem
	Güvercinayağı (<i>Ammannia coccinea</i>)	125 ml/da	Yabancı otlar 1-4 yapraklı, Çeltik 1-3 yapraklı dönem

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamız.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL MAGİCPRO

Suda çözünen Konsantre (SL)

Grubu	B	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	---	--------------------------------

40 g/l İmazamox

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında dep süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik hoşgörüsü (toleransı) sınırları dışında bir değ

Ek-2
inde

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

**TARKİM BITKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Barış SÜREL
Ziraat Yüksek Mühendisi

Devamı Arka Sayfada

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

İlaç, yabancı otların sap ve yapraklarından kolaylıkla emilir ve bitkinin her tarafına taşınır. Yabancı otların gelişmesini engeller ve 3-4 hafta içerisinde ölümlerine neden olur.

İmidazolinone toleranslı Ayçiçeği çeşitlerinde uygulama zamanı ve şekli:

Temel problem Canavar otu ise, ayçiçeğinin 6-8 gerçek yapraklı döneminde; temel problem pıtrak ve etikette belirtilen diğer yabancı otlar için ise 4-6 gerçek yapraklı döneminde yapılmalıdır. Uygulamada yelpaze tipi püskürtme yapan memeler kullanılmalı ve ilaçlama alanında memeler ayçiçeği bitkilerinin tepesinde 40-50 cm yüksekte olmalıdır. Dekara 20-40 litre su kullanılmalıdır. İlaç, damlacıklar otlar üzerinde kuruduktan sonra yağın yağmurla yıkanmaz. Uygulama döneminde hava sıcaklığının 10°C üzerinde seyretmesi ilacın etkinliğini artırır.

İMİ Toleranslı Çeltik Çeşitleri: EFDAL MAGİCPRO İMİ toleranslı çeltik çeşitlerinde kullanılır. Bitkilerin ve yabancı otların çıkışından sonra, otların 1-4 yapraklı erken dönemlerinde uygulanır.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ:

EFDAL MAGİCPRO uygulamasından sonra ekilecek bitkiler;

Hemen: Fasulye, bezelye, soya, yer fıstığı

4 ay sonra: Arpa, buğday, çavdar, yulaf, darı, nohut, ayçiçeği, tütün

9 ay sonra: Mısır, patates, çeltik, pamuk

12 ay sonra: Kolza, şeker pancarı ve diğer bitkiler

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL MAGİCPRO isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL MAGİCPRO'nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılmalıdır.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.

**EFDAL MAGİCPRO**

Suda çözünen Konsantre (SL)

Grubu	B	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	---	--------------------------------

40 g/l Imazamox

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.

**RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:**

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:287 MANİSA
Tel: 0 236 2340909 pbx.
Çağrı Merkezi: 4443150
Faks: 0 236 2379645
www.tarkimbk.com.tr

**TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:287 MANİSA
Tel: 0 236 2340909 pbx.
Çağrı Merkezi: 4443150
Faks: 0 236 2379645
www.tarkimbk.com.tr

Barış SÜREL
Ziraat Yüksek Mühendisi

Ek-2



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

02 Şubat 2024