

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NUMARASI :
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI : 06.05.1999 - 3619

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ*	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	500 g/100 L su	14 gün
	Otlakol (<i>Plasmopara viticola</i>)	3500 g/100 L su (kış uygulaması) 500 g/100 L su (yaz uygulaması)	14 gün
Elma	Kamileke (<i>Tarsonema maculata</i>)	1500 g/100 L su	14 gün
Kayın	Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (<i>Hibitomyces carpophylus</i>)	1250 g/100 L su (dormant dönem) 625 g/100 L su (normal dönem)	14 gün
Sehali	Yaprak kıvrıklığı (<i>Triplaria deformans</i>)	1500 g/100 L su	14 gün
Domates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	400 g/da	14 gün
Zeytin	Halkalı leke (<i>Spilocaea oleagina</i>)	1. uygulama 1500 g/100 L su 2. uygulama 1000 g/100 L su	14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmamalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dışı üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karışımaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanuncaya kadar karışım işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ Mildiyö'sü

1. uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamaları son verilmelidir.

LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.



LANCES LINK A.Ş.

**MANICA BORDEAUX MIXTURE
(Kullanıma Hazır Bordo Bulamacı)
İSLANABİLİR TOZ (WP)**

Grubu	MI	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	----	----------------------------

%20 Metalik bakıra eşdeğer bordo bulamacı

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 15 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Ağızdan alındığında baş ağrısı, kusma ve sindirim sisteminde ağrılara neden olur.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Ürün ambalaj ve etiketini beraberinizde bulundurun.

Deriye teması halinde, bulaşık vücut kısımlarını bol su ve sabunla yıkayın. Kirilenen giysiyi çıkarın ve su ve sabunla yıkayın. Tahriş durumunda bir doktor ya da ZEHİR MERKEZİ'ni arayın.

Göze teması halinde, hemen bol su ile yıkayın. İlk yıkamadan sonra, varsa kontak lensleri çıkarın ve en az 15-30 dakika yıkamaya devam edin. Hemen tıbbi tavsiye/yardım alın.

Soluması halinde, uygun havalandırma kullanarak maruziyeti azaltın. Hastayı temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonunda dinlendirin. Kendinizi iyi hissetmezseniz ZEHİR MERKEZİ'ni veya doktor/bakımı arayın.

Yutulması halinde, hemen ZEHİR MERKEZİ'ne veya doktora başvurun. Hemen onlara ürün güvenlik bilgi formunu ve etiketi gösterin. Bilinci açık olmayan kişiye ağızdan bir şey vermeyin.

NET MİKTARI (kg) :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) :

İÇİNDEKİLER:

Bordo Bulamacı

ZARARLILIK İŞARETİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P264: Elleçlemeden sonra cildi iyice yıkayın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P337+P313: Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK İHUSLAR:

- Ürünü kapalı orijinal ambalajında, su kaynaklarından uzakta depolayınız. Uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayınız.
- Boşaltın ürün ambalajlarını usulüne uygun olarak imha ediniz, başka amaçla kullanmayınız.
- Boşaltın gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Bahçeleri zehirlidir. Yaratlı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

GÜLDAL BAKIRCI
GENEL MÜDÜR

Q. Balıncı
LANCES LINK
Kimya ve İlaç Sanayi Ticaret A.Ş.

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR

02 Ocak 2018

Bagda Ölükol

- Kış uygulaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.
- Yaz uygulaması:
 1. uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda,
 2. uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda,
 3. uygulama sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Elma Karalekesi

1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüncü
4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Çİ) (Kayısı)

1. uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
 2. uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcuqları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde).
- Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyılırken 3. ilaçlama yapılmalıdır.

Şeftali Yaprak Kıvrıklığı

Tomurcuqlar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

Domates Mildiyözü

Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz köllü gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Zeytinlerde Halkalı Leke

Marmara Bölgesinde:

1. uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
 2. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
- Ege Bölgesinde:

1. uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
 2. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
- Akdeniz Bölgesinde:

1. uygulama: Hasattan sonra,
 2. uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
 3. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
- yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

MANICA BORDEAUX MIXTURE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MANICA BORDEAUX MIXTURE'ın aynı üretimi sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M1 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleriyle (insektisit, fungisit, bitki gelişim düzenleyicisi vb.) karıştırılmadan tek başına kullanılmaktadır.

LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.



LANCES LINK A.Ş.

MANICA BORDEAUX MIXTURE (Kullanıma Hazır Bordo Bulamacı) İSLANABİLİR TOZ (WP)

Grup	M1	Fungisit (Mantar İlacı)
------	----	----------------------------

%20 Metalik bakıra eşdeğer bordo bulamacı

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Panzehir: Methemoglobinemi, BAL, DMPS, EDTA ve D-penisilamin için Motilen Blue uygulayın.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçı ürünün kalitesini garanti eder. İmalatçı, ürünün hatalı depolanması, hatalı uygulanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

İMALATÇI FİRMA:

MANICA S.p.A.
Via all'Adige, 4
38068 Rovereto, (Trento) İTALYA
Tel: +39 (0) 464 433705

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Opr. Cemil Topuzlu Cad. Yuvam Apt. No:32/8
34726 Fenerbahçe - Kadıköy/İstanbul
Tel: 0 216 411 12 24 (3 hat)

GÜLDAL BAKIRCI
GENEL MÜDÜR

LANCES LINK
Kimya ve İlaç Sanayi Ticaret A.Ş.

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR 02 Ocak 2019