

Efdal Mebuzin

70 WP

DOMATES, SOYA, PATATES

Aktif Madde ve Miktarı	Metribuzin %70
Grubu	C1:5

HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
Sistemik Etkili

Efdal Mebuzin ile
Uzun süreli
koruma



ETKİ ŞEKLİ

- “Metribuzin” Seçici sistemik bir herbisittir.
- Yoğun olarak kökler tarafından alınsa da az bir miktar yapraklar tarafından da alınır.
- Bitki bünyesinde ksilemde akropetal (aşağıdan yukarıya) olarak taşınır.
- Fotosentezi durdurarak etki eder.

ÖZELLİKLERİ

- **Mebuzin** Suda ıslanabilir toz (WP) formülasyonludur.
- **Mebuzin** Çıkış öncesi ve çıkış sonrası kullanımı mevcuttur.
- **Mebuzin** Geniş ve dar yapraklı yabancı ot kontrolü sağlar.
- **Mebuzin** Geniş spektrumlu etkisi ve düşük kullanım dozu ile ekonomiktir.
- **Mebuzin** Toprakta kalıcı etkisi vardır. Bu nedenle toprakta yanlanma (parçalanma) ömrü oldukça uzundur ve toprak işlemesi yapılmadığı takdirde çıkabilecek yeni yabancı otlara karşı koruma sağlar.

KULLANIM DÖNEMİ

Patates:

- **Çıkış öncesi:** Patates dikiminden sonra doğrudan toprak yüzeyine uygulanır. Başka bir işlem yapılmaz. Hafif topraklarda 50-75 g/da, Ağır topraklarda 75-100 g/da kullanılması tavsiye edilir.
- **Çıkış sonrası:** Patatesler 5-10 cm boyda iken, 50-75 g/da dozda uygulanır.

Domates:

- **Fide ile domates yetiştiriciliğinde:** Şaşırtmadan birkaç gün sonra, fideler tutunca ve yabancı otların çoğu toprak yüzüne çıkınca 50-75 g/da dozda uygulanır.

Doğrudan domates yetiştiriciliğinde:

- **Çıkış öncesi:** Domates fideleri toprak yüzüne çıkmadan 30 g/da dozda uygulanır.
- **Çıkış sonrası:** Fidler 6-7 yapraklı olduğu dönemde 40-70 g/da dozda uygulanır.
- **Soya:** Ekimden hemen sonra uygulanır. Başka bir işlem gerekmez.

Domates



Patates



Horoz ibiği (*Amaranthus albus*)



Semiz otu (*Portulaca oleracea*)



Kaz ayağı (Sirken) (*Chenopodium album*)



Yabani hardal (*Sinapsis arvensis*)

UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

- Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır.
- Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.
- Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir.
- Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır.
- Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.
- İlaçlamalar yelpaze huzmeli meme tipi ile 20-40 lt/da ilaç normunda yapılmalıdır.

Hazırlanan ilaç hemen kullanılmalıdır.

Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla ilaçlı mahlül hazırlamayınız.



Yapışkan otu (*Stellaria verticillata*)

İLACI KULLANIRKEN

Kullanma dozu ve dönemine göre tavsiye edilen dozlara mutlaka uyunuz.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR			
BİTKİ ADI	GENİŞ ve DAR YAPRAKLI YABANCI OTLAR	KULLANIM DOZU VE DÖNEMİ	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
DOMATES	Yapışkan otu (<i>Stellaria verticillata</i>)	50-75 g/da	42 Gün
	Çatal otu (<i>Digitaria sanguinalis</i>)		
	Semiz otu (<i>Portulaca oleracea</i>)		
	Horoz ibiği (<i>Amaranthus albus</i>)		
	Kaz ayağı (<i>Sirken</i>) (<i>Chenopodium album</i>)		
	Demir dikenli (<i>Tribulus terrestris</i>)		
PATATES	Yabani hardal (<i>Sinapsis arvensis</i>)	50-75 g/da	
	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)		
	Bambul otu (<i>Chrozophora tinctoria</i>)		
	Sarmaşık çoban değneği (<i>Polygonum convolvulus</i>)		
	Acı ot (<i>Solanum dulcamara</i>)		
	Fare kulağı (<i>Cerastium sp.</i>)		
	Senelik köpek lahanası (<i>Mercurialis annua</i>)		
	Kaz ayağı (<i>Sirken</i>) (<i>Chenepodium album</i>)		
	Büyük pıtrak (<i>Xanthium macrocarpum</i>)		
	Demir dikenli (<i>Tribulus terrestris</i>)		
SOYA	Semiz otu (<i>Portulaca oleracea</i>)	50 g/da (Ekimden hemen sonra)	
	Alçak Sütleğeni (<i>Euphorbia prostrata</i>)		
	Kırmızı köklü tilki kuyuruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)		
	Bayır turpu (<i>Raphanus raphanistrum</i>)		

* Kabak, marul, soğan, şekerpancarı, ayçiçeği, çilek, tatlı patates ve tütün gibi birçok bitkide fitotoksiktir.

* Tavsiye edilen kültür bitkilerinde kullanınız.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.

[bitki korumada güvenilir çözüm]