

Hıyar - Kabak - Kavun - Karpuz - Bağ - Domates - Patates

Aktif Madde ve Miktarı	Metiram %57 + Cymoxanil % 4.8
Grubu	M3;U,27

FUNGUSİT (Mantar İlacı)
Sistemik ve Kontak Etkili

2
ETKİLİ
KORUMA
TEDAVİ



2
ETKİLİ KORUMA
TEDAVİ

ETKİ ŞEKLİ

Mutifa^{WG} uygulamasından sonra 60 dakika içerisinde yaprak yüzeyine yayılır ve yaprak içine hızla girer. Hastalık sporlarının çimlenmesini durdurur ve ortamdaki mevcut sporları yok eder. Ayrıca 3-4 gün öncesine kadar, enfeksiyonlar sonucu oluşmuş olan hastalıkları yok etmek suretiyle tedavi edici özelliğe sahiptir.

ÖZELLİKLERİ

- ✓ **Mutifa^{WG}** Sistemik ve Kontakt etkilidir.
- ✓ **Mutifa^{WG}** uygulandıktan itibaren 3-4 gün öncesine kadar enfekte olmuş hastalığı durdurur ve 10-12 gün süre ile yeni enfeksiyonlara karşı bitkiyi korur.
- ✓ **Mutifa^{WG}** güçlü Antisporulant etkilidir.
- ✓ WG Formülasyonu sayesinde **Mutifa^{WG}** suda maksimum düzeyde erir ve ilaç hazırlanırken kesinlikle tozuzmaz.
- ✓ **Mutifa^{WG}** kaliteli ve lekesez ürün elde etmenizi sağlar.
- ✓ Anılara zehirsizdir.
- ✓ Çiçeklenme zamanı kullanılabilir.
- ✓ Tavsiye edilen dozlarda kullanılan **Mutifa^{WG}** bitkilere hiçbir olumsuz etkisi yoktur.
- ✓ **Mutifa^{WG}** yağmurdan etkilenmez (uygulamadan sonra 1 saat sürenin geçmesi yeterlidir.)
- ✓ IPM (Entegre Mücadele)'ye uygun

Yalancı Mildiyö (*Pseudoperonospora cubensis*)Bağ Mildiyö (*Plasmopara viticola*)

KULLANMA ŞEKLİ ve ZAMANI

Domates mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 7-10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Hıyar, Kabak, Kavun ve Karpuz Kabakgillerde mildiyö: İlaçlama bitkiler kol atmaya başladığı veya ilk hastalık belirtileri görülmesiyle ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre ilaçlamaların bitkinin her tarafını özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Karpuzda erken yaprak yanıklığı: Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Bağda mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1. ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Patates mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanır.

Mildiyö (Patates) (*Phytophthora infestans*)Mildiyö (Domates) (*Phytophthora infestans*)

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir. Karışımların bekletilmeden kullanılması gerekmektedir.

KULLANILDIĞI BİTKİ ve HASTALIKLAR

BİTKİ ADI	HASTALIK ADI	KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Hıyar, Kabak, Kavun, Karpuz	Yalancı Mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	200 g/100L Su	21 Gün
Karpuz	Erken Yaprak Yanığı (<i>Alternaria cucumerina</i>)		14 Gün
*Bağ	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)		28 Gün
Domates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)		21 Gün
Patates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)		28 Gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.