

Efdal Piranil 100EC

PAMUK, BAĞ, ŞEKER PANCARI, KIRMIZI MERCİMEK, SOĞAN

Aktif Madde ve Miktarı	Propaquizafop 100 g/l
Grubu	A,1

HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
Sistemik etkili

**Dar yapraklı
yabancı ot
kontrolünde
kısa sürede etki**



ETKİ ŞEKLİ

- “Propaquizafop”: Yağ sentezini durdurur.
- Acetyl- CoA carboxylase enzimini (ACCCase) engeller.
- Geniş yapraklı kültür bitkilerinde sorun olan Graminea familyasındaki tek ve çok yıllık yabancı otlara karşı çıkıştan sonra (Post-em.) kullanılan seçici sistemik herbisittir.
- Dar yapraklı yabancı otların yapraklarından süratle alınır ve bu otların stolon ve rizom gibi toprak altı aksamalarına taşınır.

ÖZELLİKLERİ

- Pirani^{Efdal}l 100EC EC (Emülsiyon Konsantre) formülasyonludur.
- Pirani^{Efdal}l 100EC Çıkış sonrası dar yapraklı yabancı ot kontrolünü sağlar.
- Pirani^{Efdal}l 100EC Geniş yapraklı yabancı otlara etkisi yoktur.
- Pirani^{Efdal}l 100EC Bileşiminde yayıcı yapıştırıcı bulundurduğu için uygulamada ayrıca bir yayıcı yapıştırıcı madde kullanma gereği yoktur.
- Kullanmadan önce ilaç şişesini iyice çalkalayınız.

KULLANIM DÖNEMİ

Geniş yapraklı kültür bitkilerinin gelişmelerinin her döneminde kullanılabilir.
Dar yapraklı yabancı otların aktif büyüme evresinde olmaları daha iyi etki alınmasını sağlar.
Dar yapraklı yabancı otların geç dönemleri, gelişme dönemlerine göre Pirani^{Efdal}l 100EC' e daha hassastır.

Kanyaş



1



2

Uygulama zamanı



3



4

UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

- Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır.
- Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.
- Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir.
- Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır.
- Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.
- İlaçlamalar yelpaze huzmeli meme tipi ile 20-40 lt/da ilaç normunda yapılmalıdır.
- İlaçlamada iyi bir kaplama yapılması lazımdır ve uygun basınçta “3 atmosfer” uygulama yapılmalıdır.

Hazırlanan ilaç hemen kullanılmalıdır. Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla ilaçlı mahlül hazırlamayınız.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI	DAR YAPRAKLI YABANCI OTLAR	KULLANMA DOZU	KULLANMA ZAMANI	Son ilaçlama ile Hasat Arası Süre
PAMUK	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml/da	Çıkış sonrası, Kanyaş 20-40 cm iken	90 gün
*BAĞ	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	50 ml/da	Çıkış sonrası, Kanyaş 25-40 cm iken	
ŞEKER PANCARI	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	50 ml/da	Çıkış sonrası, Kanyaş 25-40 cm iken	
KIRMIZI MERCİMEK	Yabancı yulaf (<i>Avena spp.</i>) Kendi gelen Buğday (<i>Triticum spp.</i>) Kendi gelen Arpa (<i>Hordeum Vulgare L.</i>)	60 ml/da	Yabancı otların kardeşlenme devresinde	90 gün
SOĞAN	Yabancı yulaf (<i>Avena spp.</i>) Kuş yemi (<i>Phalaris spp.</i>)	35 ml/da	Yabancı otların kardeşlenme devresinde	

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Pirani^{Efdal}l 100EC, çeşitli insektisit ve fungisitler ile karışım halinde kullanılabilir. Ancak geniş yapraklı yabancı ot öldürücü bazı ilaçlar ile tank karışımı halinde kullanıldığında hem etkide hem de kültür bitkisinin tahammülünde bir miktar azalma olabildiğinden bu konuda önceden yerinde bir karışılabilirlik testi yapmadan bu gibi ilaçlarla tank karışımı halinde kullanılması tavsiye edilmez. Eğer böyle bir test yapılmamış ise, Pirani^{Efdal}l 100EC ile diğer herbisit uygulamaları arasında en az 3 gün süre bırakılmalıdır.