

Efdal 150 EC Router

PAMUK,BAĞ, ŞEKER PANCARI, MERCİMEK, SOĞAN, DOMATES, PATATES, KANOLA

Aktif Madde ve Miktarı	Fluazifop-P-Butyl 150 g/ L
Grubu	A,1

HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
Sistemik Etkili



Efdal 150 EC Router

İLACI KULLANIRKEN

Kullanma dozu ve dönemine göre tavsiye edilen dozlara mutlaka uyunuz.

ETKİ ŞEKLİ

- "Fluazifop-P-Butyl" Sistemik, seçici bir herbisittir.
- Yapraktan alınır floem ve ksilemde taşınır.

ÖZELLİKLERİ

- Emülsiyon konsantre (EC) formülasyonludur.
- Geniş Spektruma sahiptir.
- Geniş yapraklı kültür bitkilerinde çıkış sonrası kullanılır.
- Tek ve çok yıllık dar yapraklı yabancı ot kontrolü sağlar.
- Bitki koruma ürünü uygulamadan bir saat sonra yağmurdan etkilenmez.
- Kullanmadan önce ilaç şişesini iyice çalkalayınız.

KULLANIM DÖNEMİ

Çıkış sonrası: Kanyaş 15-30 cm, Darıcanlar 8-12 cm, Yabani yulaf kardeşlenme döneminde

Kanyaş



1



2 Uygulama zamanı



3

Ürün etiketindeki geniş yapraklı kültür bitkilerinin gelişmelerinin her döneminde emniyetle kullanılabilir.

KULLANIM ŞEKLİ

- Uygulama sırasında yabancı otların aktif gelişme içerisinde olmaları ve uygulama öncesi kültürel işlemlerle çok yıllık yabancı otların rizomlarının parçalanmış olması, uygulamadan daha iyi sonuç alınmasını sağlar.
- Uygulama iyi kaplama yapılması için uygun basınç ve küçük damlacıklar gereklidir.
- Uygulama için uygun basınç 3 atmosfer ve en uygun meme tipi yelpaze memelidir.
- Her türlü uygulama aleti ile uygulanabilir.
- Yer aletleriyle 20-40 litre su kullanılır.

Hazırlanan ilaç hemen kullanılmalıdır. Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla ilaçlı mahlül hazırlamayınız.

KARIŞILIRLIK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.



Köpek Dişi Ayrığı (Cynodon dactylon)



Darıcan (Echinochloa crus-galli)



Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)



Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI	DAR YAPRAKLI YABANCI OTLAR	KULLANMA DOZU ve DÖNEMİ	Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre
Pamuk	Kanyaş (Geliç) (Sorghum halepense)	100 ml/da (Kanyaşlar 15-25 cm boyda iken, 1 ay sonra yeniden çıkışlar olursa ikinci bir uygulama yapılabilir.)	56 Gün
Soğan	Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)	50 ml/da Yabani yulafın kardeşlenme döneminde	28 Gün
	Darıcan (Echinochloa crus-galli)	100 ml/da (soğanın 2 yapraklı devresinde)	28 Gün
	Kanyaş (Geliç) (Sorghum halepense)		
Bağ*	Kanyaş (Geliç) (Sorghum halepense)	100 ml/da Kanyaşlar 6-10 yapraklı veya 15-30 cm boyda iken	28 Gün
	Köpek Dişi Ayrığı (Cynodon dactylon)	150 ml/da çiçeklenme öncesi devrede	28 Gün
	Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)		
Mercimek	Yabani Yulaf (Avena fatua)	50 ml/da (Bitkiler 2-6 yapraklı, çiçeklenme öncesi yabancı otlar 3-5 yapraklı iken)	56 Gün
	Kendi Gelen Arpa (Hordeum vulgare)		
	Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)		
Şeker Pancarı	Kanyaş (Geliç) (Sorghum halepense)	100 ml/da (Kanyaşlar 15-30 cm boyda iken)	56 Gün
	Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)	50 ml/da kardeşlenme döneminde	
Domates	Darıcan (Echinochloa crus-galli)	75 ml/da (Darıcanlar 10-12 cm boyunda iken)	28 Gün
Patates	Kanyaş (Geliç) (Sorghum halepense)	100 ml/da (Kanyaşlar 15-20 cm, darıcanlar 8-10 cm boyda iken)	28 Gün
	Darıcan (Echinochloa crus-galli)		
Kanola	Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)	50 ml/da (Buğday 2-4 yapraklı, 3-5 cm boyda iken)	28 Gün
	İtalyan çimi (Lolium multiflorum)	100 ml/da (İtalyan çimi 2-4 yapraklı, 3-5 cm boyda iken)	28 Gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. Geniş yapraklı yabancı otlara etkisi yoktur.