

Efdal SC 240 Siprofen

Bağ - Elma - Kiraz - Şeftali

Aktif Madde ve Miktarı	Spirodiclofen 240g/l
Grubu	23

AKARİSİT (Kırmızıörümcek ilacı)
Kontakt etkili

Kırmızı Örümcek

mücadelesinde

ETKİLİ ÇÖZÜM



ETKİ ŞEKLİ

- **Siprofen** Kontakt etkili bir akarisitir.
- **Siprofen** zararlı popülasyonu oluşmaya başladığında kullanılmalıdır.

ÖZELLİKLERİ

- **Siprofen** "Spirodiclofen" aktif maddesini içeren SC formülasyonlu bir akarisitir.
- **Siprofen** kırmızıörümceklerin tüm gelişim evrelerinde etkilidir.


KULLANIM ZAMANI

- Bağ-İki Noktalı Kırmızıörümcek;** Yaprak başına 5-8 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.
- Elma-Akdiken akarı;** Yaprak başına ortalama 3-5 canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.
- Elma Avrupa Kırmızıörümceği;** Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.
- Kiraz- İki Noktalı Kırmızıörümcek;** Uygulamalar meyvesiz ağaçlarda veya hasattan sonra yapılmalıdır.
- Şeftali- İki Noktalı Kırmızıörümcek;** Yapılan sayımlarda yaprak başına ortalama 3-5 adet in üzerinde kırmızıörümcek bulunması durumunda uygulama yapılabilir.

KULLANMA ŞEKLİ

- Yapılacak bahçe kontrollerinde yaprak başına ortalama 3-5 canlı birey (nimf, ergin) görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.
- Kirazlarda ilaçlamalar meyvesiz ağaçlarda veya hasattan sonra yapılmalıdır.
- Bağda yaprak başına 15-20 aktif hareketli birey görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

KIRMIZIÖRÜMCEK HAYAT DÖNGÜSÜ



İki Noktalı Kırmızıörümcek
(*Tetranychus urticae*)




İki Noktalı Kırmızıörümcek
(*Tetranychus urticae*)



İki Noktalı Kırmızıörümcek
(*Tetranychus urticae*)



Akdiken Akarı
(*Tetranychus viennensis*)



İki Noktalı Kırmızıörümcek
(*Tetranychus urticae*)

Hazırlanan ilaç hemen kullanılmalıdır. Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla ilaçlı mahlül hazırlamayınız.

KULLANILDIĞI BİTKİ ve KONTROL ETTİĞİ ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ADI	KULLANMA DOZU ve DÖNEMİ	Son İlaçlama ile Hasat arasındaki süre
BAĞ*	İki Noktalı Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 L su (Nimf, Ergin)	14 Gün
ELMA	Akdiken Akarı (<i>Tetranychus viennensis</i>)	25 ml/100L su (Yumurta, Nimf, Ergin)	14 Gün
ELMA	Avrupa Kırmızıörümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	30 ml/100 L su (Yumurta, nimf, Ergin)	14 Gün
KİRAZ	İki Noktalı Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml / 100 L su (Nimf, Ergin)	—
ŞEFTALİ	İki Noktalı Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 L su (Nimf, Ergin)	14 Gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer ilaçların formülasyonu ve özellikle solvent miktarı karışımı etkiler. Bu nedenle karışım yapılacaksa uygulama öncesi bir ön karışım testi yapılmalıdır. Yayıcı-yapıştırıcı karıştırılmasına gerek yoktur.