

Sivic Tonik

Efdal

ÇİLEK-HUBUBAT(BUĞDAY, ARPA, ÇELTİK, MISIR) MEYVE(ELMA, ARMUT, ŞEFTALİ, NARENCİYE)-BAĞ-BAKLAGİLLER(FASULYE, BEZELYE, NOHUT, SOYA, MERCİMEK, YERFISTIĞI)-PAMUK-SÜS BİTKİLERİ-ŞEKER PANCARI-SEBZE (DOMATES,BİBER,PATLICAN,HIYAR,KAVUN,PATATES,KARPUZ)

Aktif Madde ve Miktarı	Sodium para-nitrophenolate 3g + Sodium orthonitrophenole 2g + Sodium penta-nitroguaiacolate 1g
Grubu	-

Bitki Gelişim Düzenleyicisi
(Stimulant) Sistemik

**Bitkinizi
Hızlandırın**



Siviç Tonik^{Efdal}

İLACI KULLANIRKEN

Kullanma dozu ve dönemine göre tavsiye edilen dozlara mutlaka uyunuz.

ETKİ ŞEKLİ

- “Sodium para-nitrophenolate, Sodium orthonitrophenole, Sodium penta-nitroguaiacolate” Kolaylıkla emilerek bitki bünyesine geçer ve hücre özsuyu hareketlerini hızlandırır.
- Böylece bitkinin bütün hücrelerine yaşamsal güç vererek çimlenme, köklenme, gelişme ve olgunlaşmanın hızlandırılmasında olumlu etki yapar.
- Özellikle döllenme üzerinde önemli etkisi vardır.

ÖZELLİKLERİ

- Siviç Tonik Suda çözünen konsantre (SL) formülasyonludur.
- Siviç Tonik Tüm bitkilerde hızlı ve eşit çimlenme, çabuk köklenme, kuvvetli ve çabuk gelişim, daha iyi ve kaliteli ürün sağlamak için tohumdan hasada kadar bitkinin yaşamı boyunca kullanılabilen bir geliştiricidir.
- Siviç Tonik Bitkileri çeşitli olumsuz büyüme koşullarına karşı koruyan, bitkilerin biyokimyasal ve fizyolojik kaynaklarını faaliyete geçiren bir stimülanıdır.
- Kullanmadan önce ilaç şişesini iyice çalkalayınız.
- pH'sı 7 civarında olan temiz su kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız. İlaçlama, günün erken saatlerinde veya akşam serinliğinde bitkinin her tarafı iyice ıslanacak şekilde kaplama ilaçlama olarak ve rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.

Hazırlanan ilaç hemen kullanılmalıdır. Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla ilaçlı mahlül hazırlamayınız.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE UYGULAMA ZAMANI

BİTKİ ADI	Uygulama Zamanı ve Şekli	Kullanma Dozu ve Dönemi
Çilek	Çiçekler görülünce 15 gün arayla	75 ml/100 L suya
Hububat (Buğday, Arpa, Çeltik, Mısır)	Çeltik tohumları ilaçlı suda 12 saat bekletilir.	200 ml/100 l suya
	Sapa kalkma döneminde ve başaklar görülünce	60 ml/dekar
Meyve (Elma, Armut, Şeftali, Narenciye)	1. Uygulama: Yeşil tomurcuk döneminde, 2. Uygulama: Pembe gonca döneminde, 3. Uygulama: Meyveler nohut büyüklüğünü alınca,	50 ml/100 L suya
Bağ*	1. ve 2. Uygulama yeni sürgünlere, 3. Uygulama çiçeklenme başlangıcında, 4. Uygulama Koruk döneminde,	50 ml/100 L suya
Baklagiller (Fasulye, Bezelye, Nohut, Soya, Mercimek, Yerfıstığı)	Meyve tutumu için, çiçeklenme öncesi ve başlangıcında	60 ml/dekar
Pamuk	1. Uygulama ilk tarakta, 2. Uygulama ilk çiçekte, 3. Uygulama kozaların %90 ı oluşunca,	50 ml/dekar
Süs bitkileri	Çelikler 5-10 dk bandırılır	25 ml/100 L suya
	Fidelikte 10 gün arayla uygulanır	16 ml/100 L suya
	Gelişim dönemlerinde	50 ml/100 L suya
Şeker Pancarı	1. Uygulama: 2-3 yaprak devresinde	25 ml/dekar
	2. Uygulama: Tekleme sonrası,	60 ml/dekar
	3. Uygulama: Kök kalınlaşması başlayınca uygulanır.	60 ml/dekar
Sebze (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Patates, Karpuz)	Tohumlar ilaçlı suda 6 saat, Patates yumruları kesilmeden 12 saat bekletilir.	50 ml/100 L suya
	Fidelikler 5 günde 1 ilaçlama yapılır.	25 ml/100 L suya
	Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada 1 uygulanır.	50 ml/100 L suya

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.