

Efdal Tarwax^{10 EC}

PAMUK, BİBER, ZEYTİN, ŞEFTALİ, DOMATES, HIYAR, PATLICAN

Aktif Madde ve Miktarı	Pyriproxyfen 100 g/L
Grubu	7C

İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
Böcek gelişim düzenleyicisidir

**Uzun Süreli
Etkili ve
Çevreye
Güvenli**



ETKİ ŞEKLİ

- **"Pyriproxyfen"** Böceklerin yumurta, larva ve nimf-lerinde etkilidir.
- **"Pyriproxyfen"** Zararlıların larva ve nimflerinin gelişimini engeller. Dönem değiştirmeleri sırasında ölürlür.
- **"Pyriproxyfen"** İlaçlamadan sonra bırakılan yumurtaların açılmasını engeller. Ergin böceklerin üremesini durdurur.

Efdal Tarwax^{10 EC} Entegre mücadele sisteminde kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLERİ

- **Tarwax^{10 EC}**, böcek larvalarına karşı geniş spektrumlu bir ilaçtır.
- **EC** formülasyonludur.
- **Tarwax^{10 EC}** Kullanıldığı ürünlerde emniyetlidir.
- **Tarwax^{10 EC}** **Anlara bekleme süresi 1 gündür.** Uygulama sırasında arı kovanını ortamdandan uzaklaştırınız.
- İlaçlama sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde yapılmalıdır, her türlü alet ile püskürtülebilir.
- Suyla hemen karıştığından her türlü ilaçlama aletiyle kullanılabilir.
- Kullanmadan önce ilaç şişesini iyice çalkalayınız.
- pH'sı 7 civarında olan temiz su kullanılması tavsiye edilir.

KULLANIM ZAMANI

Biber (Sera)- Tütün Beyazsineği: Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan seraya köşegenler yönünde girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Domates (Sera)- Tütün Beyazsineği: Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan seraya köşegenler yönünde girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Hiyar (Sera)- Tütün Beyazsineği: Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan seraya köşegenler yönünde girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Pamuk-Tütün Beyazsineği: Beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğu mücadele başlanmalıdır.

Patlıcan (Sera)- Tütün Beyazsineği: Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan seraya köşegenler yönünde girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Şeftali- Dut Kabuklubiti: Uygulamalar birinci ve ikinci döllere karşı uygulanır. İlk larva çıkışından ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı çeşitlerin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Zeytin-Kabuklubiti: Zararlının 1. dölüne karşı çok yüksek popülasyonlar dışında uygulama yapılmamalıdır. Zararlının ikinci dölünde ise bahçedeki zararlı yoğunluğu ve parazitlenme alanı göz önüne alınmalıdır. Uygulama, yumurtaların %50'sinin açıldığı ve birinci dönem larvaların çoğunlukta olduğu zaman yaprak ve meyvelerin tamamının ıslanabileceği şekilde yapılır. Bir uygulama yeterlidir.

Zeytin-Karakoşnili: Uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Bu amaçla uygulama yapılacak uygulama yapılacak bahçelerde, bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın 4 yönünden 20-25 cm uzunluğundaki sürgünler üzerinde bulunan, o yıla ait yumurtalı dişiler kontrol edilerek, yumurtadan aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtaların %50 sinin açıldığı devrede birinci, %90'nın açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.



Tütün Beyazsineği
(Bemisia tabaci)



Tütün Beyazsineği
(Bemisia tabaci)



Zeytin Kabuklubiti
(Parlatoria oleae)



Zeytin Karakoşnili
(Saissetia oleae)



Dut Kabuklubiti
(Pseudaulacaspis pentagona)

KULLANIM ARALIĞI

- **Tarwax^{10 EC}** uygulamadan sonra böcek üzerinde etkisi 20-30 gün sürdürür. Geniş kullanım aralığına sahiptir.
- Etkinliğinin devam etmesi için aynı sezon içinde, aynı bitki üzerinde 2 defadan fazla kullanmayınız.

Hazırlanan ilaç hemen kullanılmalıdır. Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla ilaçlı mahlül hazırlamayınız.

KULLANILDIĞI BİTKİ ve ZARARLILAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ADI	KULLANMA DOZU ve DÖNEMİ	Son ilaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
BİBER (SERA)	Tütün Beyazsineği (Bemisia tabaci)	50 ml/100 L su, Larva	3 Gün
DOMATES (SERA)	Tütün Beyazsineği (Bemisia tabaci)		
HIYAR (SERA)	Tütün Beyazsineği (Bemisia tabaci)		
PAMUK	Tütün Beyazsineği (Bemisia tabaci)	50 ml/da, Larva	28 Gün
PATLICAN (TARLA)	Tütün Beyazsineği (Bemisia tabaci)	50 ml/da, Larva	3 Gün
ŞEFTALİ	Dut Kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona)	50 ml/100 L su, Larva	14 Gün
ZEYTİN	Zeytin Kabuklubiti (Parlatoria oleae)		
	Zeytin Karakoşnili (Saissetia oleae)		

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Karışım durumu bilinmediğinden ön karışım denemesinin yapılması önerilir.