



tarkim
TARKİM BİTKİ KORUMA A.Ş.


Efdal 20 WP • Tebusai

BAĞ, PAMUK, ÇİLEK, DOMATES, ELMA, ARMUT, KARANFIL, GÜL, FASULYE

Aktif Madde ve Miktarı	Tebufenpyrad %20
Grubu	21A

AKARİSİT (Kırmızı örümcek ilacı)
Kontakt ve mide zehiri etkili

**Ani Öldürücü
ve Etkili
ÇÖZÜM**



Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri Şirketidir.

444 31 50
Çağrı Merkezi
www.tarkimbk.com.tr

ETKİ ŞEKLİ

- “Tebufenpyrad” Kırmızıörümceklerin larva, nimf ve erginlerine etkilidir.
- “Tebufenpyrad” Bitki dokularında translaminar özelliğe sahiptir.


KULLANIM ARALIĞI

- Tebusai geniş kullanım aralığına sahiptir.
- Üretim sezonu boyunca tavsiye edilen kültür bitkilerinde 2 defadan fazla kullanmayınız

ÖZELLİKLERİ

- Tebusai kırmızıörümceklerin hareketli dönemlerini ani öldürücü etkisi ile kontrol eder ve uzun süreli koruma sağlar.
- Tebusai WP formülasyonludur.
- Tebusai Kullanıldığı ürünlerde emniyetlidir.
- Tebusai Suyula hemen karıştığından her türlü ilaçlama aletiyle kullanılabilir.
- Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.
- pH'sı 7 civarında olan temiz su kullanılması tavsiye edilir.

KIRMIZI ÖRÜMCEK YAŞAM EVRELERİ



Armut Psillidi
(Cacopsylla pyri) ERGİN



Pamuk Kırmızıörümceği
(Tetranychus cinnabarinus)



Pamuk Kırmızıörümceği
(Tetranychus cinnabarinus)



Avrupa Kırmızıörümceği
(Panonychus ulmi)

KULLANIM ZAMANI

Armut- Armut Psillidi: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15 den fazlasında bulaşma görüldüğünde ilaçlama yapılır. Her sürgünde bir birey görüldüğü zaman o sürgün bulaşık kabul edilir.

Bağ- İki noktalı Kırmızıörümcek: Yaprak başına 5-8 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Çilek-Pamuk Kırmızıörümceği: Erken dönem uygulaması: Kırmızıörümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında çilek yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görülmeden önce), Kırmızıörümcekler görüldüğünde bir uygulama yapılmalıdır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha güvenlidir. Mevsim içi uygulama: Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, açıkta yetiştirilen çilekler mevsim başında (Mart sonu- Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve uygulanması yeterlidir. Popülasyonun yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yapraklık incelenir. Yapraklık başına 15 ve üzerinde Kırmızıörümcek tespit edilmesi halinde uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkate edilerek hasat yapılmalıdır.

Domates- Kırmızıörümcekler: Domateste yaprak başına ortalama 3-5 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Elma- Akdiken Akarı: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Elma- Avrupa Kırmızıörümceği: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Fasulye Pamuk Kırmızıörümceği: Yaprak başına ortalama 3-5 adet canlı Kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Gül- Pamuk Kırmızıörümceği: Süs bitkisi ekim alanları sık sık kontrol edilerek özellikle yaprakların altında Kırmızıörümcek aranır. Lokal bulaşma tespit edildiğinde ilaçlı mücadele sadece buralarda, sera veya açık alanlarda genelde yaygın bir bulaşmaya rastlandığında tamamı ilaçlanır.

Karanfil- Kırmızıörümcekler: Süs bitkisi ekim alanları sık sık kontrol edilerek özellikle yaprakların altında Kırmızıörümcek aranır. Lokal bulaşma tespit edildiğinde ilaçlı mücadele sadece buralarda, sera veya açık alanlarda genelde yaygın bir bulaşmaya rastlandığında tamamı ilaçlanır.

Pamuk- Kırmızıörümcekler: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklı iken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlara uygulanmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesi'nde 5 adet, Ege ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde 10 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Hazırlanan ilaç hemen kullanılmalıdır. Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla ilaçlı mahlül hazırlamayınız.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ADI	KULLANIM DOZU ve DÖNEMİ	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
ARMUT	Armut Psillidi (Cacopsylla pyri)	100 g/100 L su	7 Gün
BAĞ*	İki Noktalı Kırmızıörümcek (Tetranychus urticae)	50 g/100 L su	
ÇİLEK	Pamuk Kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus)	60 g/100 L su	
DOMATES	Kırmızıörümcek (Tetranychus spp.)	75 g/da	3 Gün
ELMA	Akdiken Akarı (Tetranychus viennensis)	30 g/100 L su	
ELMA	Avrupa Kırmızıörümceği (Panonychus ulmi)	37.5 g/100 L su	
FASULYE	Pamuk Kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus)	75 g/100 L su	7 Gün
GÜL	Pamuk Kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus)	60 g/100 L su	
KARANFİL	Kırmızıörümcek (Tetranychus spp.)	60 g/100 L su	
PAMUK	Kırmızıörümcek (Tetranychus spp.)	60 g/da	

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Uygulama için çok miktarda karışım yapılmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.