

Efdal Tefmolt Super

Biber - Armut - Pamuk - Antep Fıstığı - Mısır

Aktif Madde ve Miktarı	Teflubenzuron 150 g/l
Grubu	15

İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
Kontak ve Mide Zehiri Etkili

**Uzun Süreli
Etkili ve
Çevreye
Güvenli**



ETKİ ŞEKLİ

- “Teflubenzuron” Mide ve temas yoluyla etkili bir ilaçtır.
- “Teflubenzuron” Böcek büyümesini ve gelişimini önleyici bir böcek ilacıdır.
- “Teflubenzuron” Larvalarda ve nimflerde kitin oluşumunu engelleyerek gömlek değişimi sırasında ölümlerine neden olur.
- Uygulamadan sonra böceklerde beslenme azalır.
- “Teflubenzuron” Etki şeklinin özelliği nedeniyle larva öldürücü etkisi birkaç gün sonra görülür.
- “Teflubenzuron” Etkisinde kalan erginlerin koyduğu yumurtaların büyük bir kısmı açılmaz.



Ergin

Armut Psillisi (*Cacopsylla pyri*)

Nimf



Kelebek

Pamuk Yaprak Kurdu (*Spodoptera littoralis*)

Larva



Kelebek

Mısır Çizgili yaprak kurdu (*Spodoptera exigua*)

Larva



Ergin

Antep Fıstığı Yaprak Psillisi (*Agonoscena pistaciae*)

Nimf

ÖZELLİKLERİ

- Tefmolt Super SC formülasyonlu bir ilaçtır.
- Tefmolt Super larvalarda ve nimflerde kitin oluşumunu engelleyerek gömlek değişimi sırasında ölümlerine neden olur.
- Tefmolt Super ilaçlamadan sonra böceklerde beslenme azalır. Etki şeklinin özelliği nedeniyle larva öldürücü etkisi birkaç gün sonra görülür.
- Tefmolt Super etkisinde kalan erginlerin koyduğu yumurtaların büyük bir kısmı açılmaz.

İlaçlamalar yağışsız ve rüzgarsız günlerde, günün sıcak olmayan serin ve sakin zamanlarında yapılmalıdır.

KULLANIM ZAMANI

- **Antepfıstığı Psillidi:** Haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.
- **Armut Psillidi:** Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimflerin görülmeye başlandığı, sürgünlerin %15'ten fazlasında bulaşma görülmeye başlandığı, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterlidir.
- **Biber- Pamuk Yaprakkurdu:** Köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde uygulama yapılır.
- **Mısır- Pamuk Çizgili Yaprakkurdu:** Tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5'er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. Uygulama ortalama 2 larva/bitki olduğunda yapılır.
- **Pamuk- Pamuk Çizgili Yaprakkurdu:** 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0,5 larva yada 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Hazırlanan ilaç hemen kullanılmalıdır. Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla ilaçlı mahlül hazırlamayınız.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ADI	UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
ANTEPFISTIĞI	Antepfıstığı Psillidi (<i>Agonoscena pistaciae</i>)	100 ml/100 L su Nimf	14 Gün
ARMUT	Armut Psillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	50 ml/100 L su Nimf, Ergin	14 Gün
BİBER	Pamuk Yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	35 ml/da Larva	3 Gün
MISIR	Pamuk Çizgili Yaprakkurdu (<i>Spodoptera exigua</i>)	40 ml/da Larva	14 Gün
PAMUK	Pamuk Çizgili Yaprakkurdu (<i>Spodoptera exigua</i>)	35 ml/da Larva	14 Gün

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapılmadan mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır.