

Efdal Ultramix

ARPA, BUĞDAY, MISIR

Aktif Madde ve Miktarı	2,4-D 2-Ethylhexyl Ester 452,42 g/ L + Florasulam 6.25 g/L
Grubu	0,4 + B,2

HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
Sistemik Etkili

**Ürününüzü
Efdal Ultramix ile
yabancı otlardan
koruyunuz.**



ETKİ ŞEKLİ

- “2,4-D 2-Ethylhexyl Ester, Florasulam” Seçici sistemik bir herbisittir.
- Kök ve sürgünlerden alınarak floem ve ksilemde taşınır.
- Meristem dokularda birikir.
- 7-10 gün boyunca bitki tarafından alınmaya devam eder.


ÖZELLİKLERİ

- **Ultramix** Suspo-emülsiyon (SE) formülasyonludur.
- **Ultramix** Çok sayıda geniş yapraklı yabancı otu kontrol eder.
- **Ultramix** Gelecek mahsüle etki etmez.
- **Ultramix** Geniş kullanım aralığı vardır.
- **Ultramix** Günlük ortalama sıcaklığı 5-25 °C arasında iken rahatlıkla uygulanabilir.
- **Ultramix** Aktif madde 1 saat içinde yaprağa nüfuz eder.
- **Ultramix** İlk belirtiler uygulamadan hemen sonra 1-2 gün içinde görülmeye başlanır.
- **Ultramix** Tam kontrol 7-21 içinde olur.
- **Ultramix** Tekrar ekim dikim yapılması gereken durumlarda; Uygulamadan 2 hafta sonra hububat, uygulamadan 4 hafta sonra mısır, soya, ayçiçeği ekilir.

Kullanmadan önce ilaç şişesini iyice çalkalayınız


KULLANIM DÖNEMİ

Mısır gelişim evreleri



Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı, yabancı otların çıkışını tamamladığı dönemde kullanılır.

Hububat gelişim evreleri



Yabancı otların çıkışını tamamladığı devrede, Hububatın Kardeşlenme başlangıcından sapa kalkma dönemine kadar uygulanır.

! Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulamayın.

KULLANIM ŞEKLİ

- **Ultramix**, suspo-emülsiyon şeklinde bir ilaç olduğundan ilacın su ile iyice karışması çok önemlidir.
- Uygulamalardan en iyi etki yabancı otların gerçek yapraklarının görüldüğü, hızlı büyüme içinde olduğu ve üstlerinin hububat tarafından kapatılmadığı zaman yapılan ilaçlamalardan alınır.
- İlacın etkisi kullanılacak su miktarı ile yakından ilgilidir.
- Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

Hazırlanan ilaç hemen kullanılmalıdır. Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla ilaçlı mahlül hazırlamayınız.

- Uygulama sırasında ve sonrasında (7-10 gün) günlük ortalama sıcaklık 15 °C üzerine çıkarsa **geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar görebilir.**
- Dolayısı ile bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu **Akdeniz, Güneydoğu ve Ege Bölgelerinde kullanılması tavsiye edilmez.**



Kekre
(*Acroptilon repens*)



Tarla Sarmaşığı
(*Convolvulus arvensis*)



Gökbaş
(*Centaurea sp.*)



Meryem Dikeni
(*Silybum marianum*)

Hazırlanan ilaç hemen kullanılmalıdır. Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla ilaçlı mahlül hazırlamayınız.

KULLANILDIĞI BİTKİ ve KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR			
BİTKİ ADI	GENİŞ YAPRAKLI YABANCI OT ADI	KULLANIM DOZU ve DÖNEMİ	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Arpa, Buğday	Adi Fiğ (<i>Vicia sativa</i>)	50 ml/da	14 Gün
	Boynuz Otu (<i>Cerastium dicothomum</i>)		
	Kaba Tüylü Fiğ (<i>Vicia narbonensis</i>)		
	Kan Damlası (<i>Adonis aestivalis</i>)		
	Kıraç Itırı (<i>Geranium stepporum</i>)		
	Rum Yalancı Keteni (<i>Camelina rumelica</i>)		
	Sarı Ot (<i>Boreava orientalis</i>)		
	Sarkık Meyveli Yavruağzı (<i>Hypecoum pendulum</i>)		
	Siğir Dili (<i>Anchusa azura</i>)		
	Taşkesen Otu (<i>Buglossoides arvensis</i>)		
	Trakya Hardalı (<i>Neslia apiculata</i>)		
	Uzun Meyveli Bülbül Otu (<i>Sisymbrium altissimum</i>)		
	Uzun Süpürge Otu (<i>Descurania sophia</i>)		
	Yabani Çivit Otu (<i>Isatis tinctoria</i>)		
	Yabani Hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)		
	Yabani Tere (<i>Cardaria draba</i>)		
	Yatık Boya Kökü (<i>Asperugo procumbens</i>)		
Arpa, Buğday	Boynuzlu yoğurt otu (<i>Galium tricornutum</i>)	60 ml/da	14 Gün
	Çoban Değneği (<i>Polygonum bellardi</i>)		
	Meryem Dikeni (<i>Silybum marianum</i>)		
	Parmaklı Yavşan Otu (<i>Veronica triphyllos</i>)		
	Saka Dikeni (<i>Carduus picnocephalus</i>)		
	Tarla Düğün Çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>)		
	Tarla Hazeranı (<i>Consolida regalis</i>)		
	Tarla Papatyası (<i>Anhemis fumarifolia</i>)		
Arpa, Buğday	Doğu Ballıbabası (<i>Wiedemannia orientalis</i>)	70 ml/da	
	Gökbaş (<i>Centaurea sp.</i>)		
	Kekre (<i>Acroptilon repens</i>)		
	Kokarot (<i>Bifora radians</i>)		
	Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>)		
Mısır	Adi Soda Otu (<i>Salsola kali</i>)	70 ml/da	
	Dil Kanatan (<i>Galium aparine</i>)		
	Domuz Pitrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)		
	Gece Sefası (<i>Ipomea stolonifera</i>)		
	Gökbaş (<i>Centaurea sp.</i>)		
	İmam Pamuğu (<i>Abutilon theophrastii</i>)		
	Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)		
	Köpek Üzümlü (<i>Solanum nigrum</i>)		
	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)		
	Uzun Loğusaotu (<i>Aristolochia clematitis</i>)		
Yatık Sirken (<i>Chenopodium vulvaria</i>)			
Mısır	Kekre (<i>Acroptilon repens</i>)	80 ml/da	
	Tarla Sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>)		
! Hibrit mısır tohumu üretiminde ve şeker mısır yetiştiriciliğinde kullanılmaz.			

! Hibrit mısır tohumu üretiminde ve şeker mısır yetiştiriciliğinde kullanılmaz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

[bitki korumada güvenilir çözüm]